of meningiomas[J]. J Neurooncol, 2010, 99(3): 379-391.
[2] Park K J, Kang S H, Chae Y S, *et al*. Influence of interleukin-6 on the development of peritumoral brain edema in meningiomas[J]. J Neurosurg, 2010, 112(1): 73-80.
[3] Lee K J, Joo W I, Rha H K, *et al*. Peritumoral brain edema in meningiomas: correlations between magnetic resonance imaging, angiography, and pathology[J]. Surg Neurol, 2008, 69(4): 350-355.
[4] Yamakami I, Higuchi Y, Horiguchi K, *et al*. Treatment policy for petroclival meningioma based on tumor size: aiming radical removal in small tumors for obtaining cure without morbidity[J]. Neurosurg Rev, 2011, 34(3): 327-334.
[5] 夏亮, 郭国炳, 楚胜华, 等. 脑膜瘤的影像学特征与病理诊断的关系[J]. 中国临床神经外科杂志, 2006, 11(5): 274-275, 278.
[6] Louis D N, Ohgaki H, Wiestler O D, *et al*. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system[J]. Acta Neuropathol, 2007, 114(2): 97-109.
[7] Pereira-Filho-Nde A, Soares F P, Chemale-lde M, *et al*. Peritumoral brain edema in intracranial meningiomas[J]. Arq Neuropsiquiatr, 2010, 68(3): 346-349.
[8] 彭龙, 周东, 侯庆石, 等. 水通道蛋白-4与脑膜瘤瘤周水肿的关系[J]. 中国临床神经外科杂志, 2012, 17(2): 94-96.
[9] 刘忆, 漆松涛, 张喜安, 等. 脑膜瘤的病理类型、部位与瘤周水肿的关系[J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2011, 16(4): 168-170.
[10] 杨志林, 柯以铨, 徐如祥, 等. 脑膜瘤部位、大小及病理分型对瘤周水肿的影响[J]. 第四军医大学学报, 2007, 28(17): 1603-1605.
[11] Schmid S, Aboul-Enein F, Pfisterer W, *et al*. Vascular endothelial growth factor: the major factor for tumor neovascularization and edema formation in meningioma patients[J]. Neurosurgery, 2010, 67(6): 1703-1708.
[12] 秦成伟, 谭晓天, 赵俊军, 等. WHO Ⅰ型脑膜瘤瘤旁脑水肿的MR表现与脑膜瘤病理类型的关系研究[J]. 大连医科大学学报, 2010, 32(3): 286-289.

(**收稿**:2012-09-26;**修回**:2012-12-04)
(编辑　汪勤俭)

“第二届回生口服液与恶性肿瘤/凝血紊乱学术论文征文活动”通知

近年来研究表明,恶性肿瘤和凝血紊乱之间关系密切,甚至互相促进,对患者的治疗和康复造成了很大影响。回生口服液是由成都地奥集团天府药业于1994年推出的治疗恶性肿瘤的复方中药制剂。在临床使用近20年中,抗肿瘤、改善患者生存质量和纠正凝血紊乱等疗效确切,得到了广大医生、患者的认可。成都地奥集团天府药业联合《中国实用内科杂志》、《山东医药》杂志于2011年联合发起“第一届回生口服液与恶性肿瘤/凝血紊乱学术论文征文活动”,取得了圆满成功。为了更好地推动相关研究,成都地奥集团天府药业股份有限公司联合《第三军医大学学报》、《中国实用内科杂志》共同发起“第二届回生口服液与恶性肿瘤/凝血紊乱学术论文征文活动”。

征文内容:①回生口服液对不同肿瘤的疗效观察;②回生口服液与其他治疗(手术、放化疗、内分泌治疗、分子靶向治疗等)联合使用的方法研究和疗效观察;③回生口服液对患者生存质量的作用;④回生口服液在恶性肿瘤患者中预防性抗凝治疗的疗效、对预后的影响(如对治疗后转移复发等);⑤凝血紊乱的近期、远期检测指标,各指标灵敏度、特异度。⑥恶性肿瘤与凝血紊乱/血栓性疾病发生的流行病学研究。

要求:①与其他治疗方案联合时,应该说明回生口服液的使用方法、剂量、疗程持续时间,并应该排除其他药物的干扰;②与凝血紊乱相关的研究,检测指标必须包括凝血4项、血小板计数、D-Dimer,有条件者应该纳入蛋白C和蛋白S,其余研究者自选;③临床试验须严格按照临床科研方法设计,要求严谨、真实;④应征论文须未公开发表过。

征文栏目:论著、短篇论著。截稿日期:2013年10月31日。论文投递方式:上杂志社网页实名注册投稿,请在投稿中文题目前注明“(征文)”字样。《第三军医大学学报》网址:http://aammt.tmmu.edu.cn/

奖励办法:①设立一、二、三等奖及优秀奖各1名、2名、3名、10名,分别奖予10 000、5 000、3 000、1 000元奖金,并颁发获奖证书(第一届征文活动一等奖空缺,10 000元奖励累计到本届,即本届一等奖实际奖金20 000元)。②获奖论文将被《第三军医大学学报》、《中国实用内科杂志》择优发表;③每位投稿作者均可获得国家继续教育学分及论文集;④所有投稿文献将汇编为杂志单行本。

《第三军医大学学报》
《中国实用内科杂志》
成都地奥集团天府药业股份有限公司