[6] 刘 莹,王艳冬. 不同生理踝部足背动脉血压与肱动脉血压相关性研究[J]. 疾病监测与控制杂志,2012,2(6):68 - 69.
[7] 李铭新,刘 玲. 尿毒症患者甲状旁腺全切术加前臂移植术后的补钙[J]. 中国血液净化杂志,2011,3(10):140 - 144.
[8] 高 娴,肖 莉,黄海英. 155 例甲状腺手术后并发症的护理[J]. 局解手术学杂志,2011,20(3):245.
[9] 贺润莲. 葡萄糖酸钙致组织损伤早期处理方法的临床观察[J]. 山西医药杂志,2002,31(6):526.

(编辑:周小林)

# 粘性裤带的临床应用体会

刘 玲,向佳梅,张 瑜 (第三军医大学新桥医院普通外科,重庆 400037)

[关键词] 粘性裤带;应用;制作
[中图分类号] R619.9 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2015)02-0233-01

痔疮、肛裂、肛门外伤、直肠肿瘤、麦氏手术后,由于其部位的特殊性,术后敷料不易固定[1]。我科固定会阴部敷料常用绷带自制"丁"字带,其制作繁琐,容易滑脱,固定必须采用打结方式,使患者产生不适感。某些患者自行应用各种一次性纸尿裤,其通透性差,容易磨损,且对伤口的保护作用不理想。为了克服上述会阴部敷料固定的缺点,我们设计和研制了粘性裤带。粘性裤带用于会阴部手术以来,节约了医疗资源,减轻了患者的痛苦,降低了伤口感染率,在会阴部手术后应用收到了很好的效果[2]。现报告如下。


## 1 材料与方法

### 1.1 材料

粘性裤带的主体部分以厚实质软的双层棉布为材料,两端及相连部分配以粘胶带,使临床操作更简单方便。

### 1.2 制作方法

粘性裤带由腰带和裤带两部分组成。以厚实软质的双层棉布为材料,先制成长 100 cm、宽 3 cm 的长方形腰带。腰带背侧一端缝制 5 cm 凸形粘胶带,另一端缝制长 10 cm,宽 3 cm 整块凹形粘胶带,腰带正侧缝制长 10 cm,宽 3 cm 整块凹形粘胶带。以厚软质的双层棉布为材料,制作长 70 cm,宽 3 cm 长条性裤带,裤带一端固定于腰带正中背侧,另一端缝制 5 cm 凸形粘胶带(见图 1a)。使用时将长方形腰带置于患者腰部,根据腹围大小在腹部正中对合粘胶带贴[3];裤带从腰部绕经会阴部粘贴至腰带正中的凹形粘胶带(见图 1b)。




a:粘性裤带平展示意图;b:粘性裤带应用示意图

**图 1 粘性裤带**

## 2 讨论

为了方便患者,临床医护工作者根据经验各科患者设计、改良各种病员裤[3-4]。这种粘性裤带的临床应用优点是:①经济实惠。粘性裤带可反复使用,可节省大量绷带,避免了一次性浪费,减轻了患者的经济负担。②操作简单方便。整个设计均采用粘胶固定,操作简单,能够根据医患双方需要灵活地调整限制腹部及会阴部的长度和松紧度。不需要医生再使用绷带自制"丁"字带,节约人力及时间。③固定性能好。相较"丁"字带,滑脱概率大大减小,即使滑脱了,患者自己就可立即固定。④舒适感强。"丁"字带由绷带制作完成,随着患者的运动,绷带容易拧成一根细绳,容易让患者不适,甚至可能摩擦伤口引起疼痛、感染等并发症。同时,粘性裤带勿需打结,患者能随意变更体位,极大方便了患者术后活动。

[参考文献]
[1] 叶林娇,谢玉兰,曾丽霞. Y 型固定带的研制与临床应用[J]. 赣南医学院学报,2006,26(4):642 - 643.
[2] 徐志华. 简易棉布兜在会阴部手术中的应用[J]. 护理研究:中旬版,2009,23(9):2367.
[3] 王立明,杨 桦,向家梅,等. 改良式多头腹带的临床应用[J]. 中国普外基础与临床杂志,2010,17(10):1106.
[4] 王安静,周晓菊,刘 英. 一种裤衩分离式病员裤在患者中的应用[J]. 局解手术学杂志,2014,23(3):327.

(编辑:周小林)

doi:10.11659/jjssx.08E014012
[收稿日期] 2014-09-29 [修回日期] 2014-10-17