维普资讯 http://www.cqvip.com

成簇，这种软组织密度结节周围环以浅淡的、磨玻样的晕征，对本病早期诊断具有高度的提示性价值；其次就是结节状的伴有中心坏死和周围新月状或环状的空气半月征。本组病例中均有晕征或空气半月征出现。Kuhlman等[3]报告的8例早期侵袭型肺曲霉菌病中，7例均有晕征，另一例内病太小，无法显示，这些均表明晕征式空气半月征为本病的较为特征性的征像。

侵袭型肺曲霉菌病的诊断与鉴别，由于本病在影像表现具有一定的特征：早期为结节伴日晕征，中、晚期主要为新月征，所以在临床上，对于慢性消耗性疾病以及免疫功能受损的患者，当出现顽固性的肺部疾病时，而CT表现出日晕征或空气新月征时，高度提示为本病，但是晕征和空气半月征并非本病的非特异性征像，其中，有日晕征改变的应与其它出血性肺内感染以及其它非感染性病灶，如巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、Wegener肉芽肿等相鉴别，而有空气半月征的应与其它霉菌感染、结核及细胞感染性病变相鉴别。这些都可以通过其不同的临床表现及实验室检查结果来鉴别诊断[4-5]。

综上所述，在特定的临床背景下，对于慢性消耗性疾病及免疫功能受损的患者，当出现顽固性肺部疾病，CT扫描发现日晕征或空气半月征时，强烈提示肺部有侵袭型肺曲霉菌病的可能性，切勿偏向于单一疾病的诊断，可结合临床资料或CT引导穿刺并进行组织病理学检查来确定诊断，并及早采取正确的治疗措施，提高患者的生存率，所以CT检查对侵袭型肺曲霉菌病的诊断与临床治疗均具有重要的参考价值。

[参考文献]

[1] 杨 萍，刘继汉. 机遇性侵袭型肺曲霉菌病1例报告[J]. 实用放射学杂志，1997，13(12)：764－765.
[2] 章华权，张小宇. 32例矽肺的CT检查与X线平片对照分析[J]. 放射学实践，2004，19(6)：462－463.
[3] Kuhlman JE, Fishman EK, Burch PA, et al. CT of invasive pulmonary aspergillosis[J]. AJR Am J Roentgenol, 1988, 150 (5): 1015－1020.
[4] 付 平，肖 湛，何远宇，等. 增强CT动态扫描对孤立性肺结节鉴别诊断的意义[J]. 局解手术学杂志，2004，13(3)：210－211.
[5] Angus RM, Davies ML, Cowan MD, et al. Computed tomographic scanning of the lung in patients with allergic bronchopulmonary aspergillosis and in asthmatic patients with a positive skin test to Aspergillus fumigatus[J]. Thorax, 1994, 49(6): 586－589.

（编辑：郭光金）

·个案与短篇·

护士长与护士沟通本在护理管理中的应用

闫丽华 （佳木斯市中心医院二部，黑龙江 佳木斯 154002）

[关键词] 护士长；护士；沟通
[中图分类号] R471 [文献标识码] B [文章编号] 1672－5042(2005)02－0098－01

在护士日常工作中，护士往往分各种班次，分散在不同的时间上岗，护士长与护士每天在一起沟通的时间各不相同。加之周六、周日护士长经常不在班上，给护士长与护士的沟通带来不便。为此，我科于2003年6月起建立护士长与护士沟通本，作为护士长与护士沟通的桥梁，为加强护理管理、提高护理质量起到了良好作用。

1 沟通内容

①院领导对护理工作的指示；②护理部对护理工作具体要求；③护士长针对本科情况提出的新举措；④护士对工作提出的问题和建议。

2 应用情况

①要求每名护士每班必须阅读沟通本；②每名护士及护士长均可将想互相告之的内容写在沟通本上，护士长和护士每天在阅读后签字，作为相互知晓的依据。

3 体会

①通过半年的应用，使护理管理达到令行禁止，上级的指示在最短的时间内迅速传递；②减少了护士在休息时间来院参加会议的次数，使护士有充足的休息时间；③避免了反复传达造成的漏项情况，使护士得到的信息全面、一致、有据可查；④避免一旦发生问题时相互推诿、强词夺理。

通过沟通本的应用，使护理部和科护士长提出的各项考核和要求人人皆知，减少了差错事故的发生，提高了护理质量，在医院组织的护士工作质量评比中，我科护士整体考核成绩由下游逐渐提高到中上游水平，实施前后各发放62份问卷进行患者满意度调查，结果是患者对护士满意度由95%提高到98%，使护理工作出现了新起色。

[收稿日期] 2004－12－25 [修回日期] 2004－01－26

（编辑：黄春霞）