维普资讯 http://www.cqvip.com

局解手术学杂志 1997 年第 6 卷第 1 期总第 21 期

电熨术治疗宫颈糜烂 186 例临床观察

山东铝业公司职工医院妇产科 刘丽云
山东铝业公司职工医院内科 赵忠德
(山东淄博,邮政编码 255069)

R711.320.5

子宫颈糜烂,是妇科中最常见病之一,多见于婚后妇女,严重影响着妇女的身体健康,笔者自 1991 年至 1995 年采用电熨术治疗宫颈糜烂 186 例,疗效满意,报告如下:

临床资料

一、本文 186 例患者,年龄为 23 岁至 52 岁均未曾接受过其它物理疗法;35 岁以上的患者治疗前均行宫颈刮片脱落细胞检查,排除癌前病变。

二、宫颈糜烂分度。糜烂面积小于原宫颈面积的 1/3 为Ⅰ度;糜烂面积大于 1/3 小于 1/2 者为Ⅱ度,糜烂面积超过 1/2 者为Ⅲ度,186 例宫糜烂情况见后表。

手术方法

时间选择在月经干净后 3～7 天。患者取膀胱截石位常规消毒,擦净外阴、阴道宫颈分泌物,调好功率后,直达宫颈口处开始电熨,逐渐向外扩展,至超过宫颈糜烂面外缘 0.1～0.2cm,深度使组织变为灰白或微黄色为宜,遇到有宫颈腺体囊肿时应彻底破坏囊壁后再电熨,有宫颈息肉应先切除后再电熨。术中患者有轻度均热感,手术完毕后,症状即可消失。手术后创面喷洒土霉素药粉,预防感染,手术后两个月内禁止性生活及盆浴。

疗效观察

186 例患者,手术后 10 天复查,有较多的淡黄色水样分泌物,无需特殊处理,手术后两周复查,创面形成一层白膜状保护痂,手术后两个月复查,保护痂脱落,宫颈光滑。疗效标准:痊愈:糜烂面消失。显效:糜烂面明显缩小为原面积的 1/2 以上。有效:糜烂面有部分缩小或由乳头型、颗粒型转为单纯型。186 例患者,Ⅰ度糜烂的治愈 25 例,占总人数的 13.44%;Ⅱ度糜烂的治愈 89 例,占总人数 47.85%,Ⅲ度糜烂的治愈 72 例,占总人数的 37.6%,有效率 100%,有效治愈率 98.92%。见附表。

附表　宫颈糜烂分型治疗情况统计表

类型 / 分度 / 数量	单纯型		颗粒型			乳头型			合计		
	例数	治愈率	例数	治愈率	好转	例数	治愈率	好转	例数	治愈率	好转
Ⅰ度	20	100%				5	100%	25	100%		
Ⅱ度	30	100%	13	100%		46	100%		80	100%	
Ⅲ度	7	100%	18	100%		47	95.74%	2	72	100%	2
合计	57	100%	31	100%		98	97.96%	2	186	100%	2

讨　论

子宫颈糜烂是育龄妇女的常见病多发病,积极治疗子宫颈糜烂是降低宫颈癌发病率的重要措施之一。电熨术治疗宫颈糜烂利用高频电凝原理,采用球形电极与宫颈糜烂面接触,通过电熨除去病变组织,使糜烂面形成一层保护痂,再经过脱痂,被新生的鳞状上皮部分覆盖,达到治疗目的方法。186 例患者在治疗观察过程中,未发生过出血及并发症,治疗率在 98.92%,治疗前后不需放取节育环,必须注意选择适应症和禁忌证。我的体会是,这种方法操作简便治愈率高,患者无痛苦,容易接受,效果满意。

(收稿日期:1996－07－12)