维普资讯 http://www.cqvip.com

出血性输卵管炎常有近期妇科操作史及分娩史等感染史，起病不如宫外孕急骤，停经的发生率低且不可靠，妊娠试验阴性。因是炎症引起血管充血，血管壁渗透性增强所致渗血，故失血速度较慢，出血量往往较少，发生休克者比宫外孕少得多。术中发现腹腔积血，患侧输卵管充血，增粗水肿，活动性出血而未见卵巢破裂及异位妊娠征象时应考虑为本病。本组两例近期均有人工流产史，腹腔内出血不多，尿妊娠试验未做，由于对出血性输卵管炎认识不足，均误诊为宫外孕，行剖腹探查术。例 1 腹腔内出血仅 200ml。如术前能考虑到本病，可保守治疗，或许能避免手术。

（收稿日期：1994—05—02）

43 大腿 软组织撕脱伤 清创术 治疗 25

大腿严重软组织撕脱伤清创术治疗

石家庄市第一医院手术室 **杨翠银**

（河北石家庄，邮政编码 050011）

R658.3

大腿大面积软组织撕脱伤，不仅造成皮肤、肌肉广泛捻挫伤，而且常伴有神经、血管和骨骼的严重损伤，是一种复杂的复合性创伤。大部分病人患肢血液循环发生障碍，如果处理不当，可留下严重残疾，甚至危及生命。

我院自 1993 年 9 月～1994 年 3 月急诊收治大腿软组织撕脱伤 7 例，通过认真清创手术取得了较好效果。

临床资料：本组病人，男 4 例，女 3 例，最大 52 岁，最小 21 岁。7 例病人均有广泛软组织撕脱及开放性骨折，明显的出血休克，皮肤苍白，湿冷或紫绀。均采取同种清创术，效果满意，术后均未发生感染。

典型病例：患者，女，30 岁，农民，住院号：36476。患者骑自行车不慎被汽车轧伤，致左侧大腿内侧，会阴部至膝关节长约 70cm 皮肤撕脱伤，肌肉广泛捻挫伤断裂，肛门周围 2/3 齿状线的皮肤撕裂，股骨上段骨折，胫腓骨骨折，膑骨粉碎性骨折。于创伤后 2 小时来我院求治，病人已处于休克状态，即行输液、输血抗休克，急诊清创术。

术前准备：肥皂水、1‰新洁尔灭、碘伏稀释液（原液加五倍蒸馏水）有效碘达到 100ppm，碘伏（原液）消毒毛刷，蒸馏水，外用盐水。清创法：麻醉后：1. 先用肥皂水、毛刷进行皮肤周围清洁，用无菌纱布擦干，重复 1 次；再用肥皂水、毛刷清洗创面 1 次，外用盐水冲洗后擦干。2. 用 1‰新洁尔灭、毛刷冲刷创面二次，蒸馏水冲洗。3. 碘伏稀释液冲刷创面一次，外用盐水冲洗，消毒纱布擦干。4. 碘伏原液消毒创面，皮肤二次。5. 切除创面坏死组织及皮肤创面边缘组织，缝合皮肤。6. 大腿创面在不同部位开窗引流。

（收稿日期：1994—07—08）

突出两项基础技术在手术学基础教学中的意义

第一军医大学第一附属医院外科教研室 **孙大成 黄祥成**

（广东广州，邮政编码 510515）

突出重点教学内容是医学教育中的普遍原则，在手术学基础教学中，如何突出重点，求得良好的教学效果，是值得摸索和探讨的。我们在手术学基础教学中为保证教学质量，对技能训练的教学原则，教学目标，带教方法等进行了一系列的研究和探讨，并改进了练习教具，持续开展第二课堂教学活动等，有力地促进了训练质量的提高。虽然如此，我们认为强调突出两项基本技术，即无菌技术和手术基本操作技术，并不是一句空话。10 年来，我们在各项教学改革中，一直以突出两项基本技术做为教改的核心问题抓住不放，并取得了满意的教学效果。

一、外科手术的复杂性要求突出两项基本技术。