[参考文献]

[1] 羊惠君,王怀经,王健本,等. 实地解剖学[M]. 北京:人民卫生出版社,2002. 76-77.

[2] 张朝佑. 人体解剖学[M]. 第2版. 北京:人民卫生出版社,1998. 866.

(编辑:余汇洋)

# 双侧小隐静脉变异1例

刘新昊[1],吴江红[1],朱星红[2] (第三军医大学:1. 学员旅4队;2. 基础部人体解剖学教研室,重庆 400038)


[关键词] 小隐静脉;变异;解剖学

[中图分类号] R322.123 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2009)05-0359-01

小隐静脉汇入部位变异常有报道[1-2],作者在解剖一具中年男性尸体标本时,发现其双侧小隐静脉行程及注入均有变异,较为少见,现报告如下,供临床参考。

## 1 材料与方法

10%福尔马林固定的中年男性尸体标本1具,解剖显露小隐静脉,观察记录静脉行程及注入部位,并用游标卡尺(精确度为0.05 mm)测量其压扁管径。



a、b:左侧;c:右侧;1:大隐静脉;2:小隐静脉;3:小隐静脉外侧支;4:小隐静脉内侧支;5:胫神经;6:腓肠肌;7:半腱肌;8:股二头肌;9:缝匠肌;10:股薄肌

**图1 双测小隐静脉变异**

[收稿日期] 2009-05-16 [修回日期] 2009-06-15

## 2 结果

该标本左侧小隐静脉在足外侧缘起自足背静脉弓,经外踝后方,沿小腿中央上行至腘窝下角(管径5.15 mm),再经腓肠肌两头间上行,不穿腘筋膜,未注入腘静脉,向上内侧上行,由腘窝内上界中点出腘窝(该处管径3.75 mm),向内上行转至股后内侧,继续上行至股前内侧区于股三角尖内侧1.27 cm处注入大隐静脉主干(图1a、b)。汇入前小隐静脉管径3.50 mm,汇入前大隐静脉管径5.65 mm,汇入后大隐静脉管径6.05 mm。

右侧小隐静脉起自足背静脉弓,由外踝前方中部移行向内上方转至内踝后方,沿小腿中央上行,血管逐渐变细,至腘窝下角1.69 cm处分为内、外侧2支。外侧支(管径2.30 mm)沿腓肠肌两头间上行,穿腘筋膜,注入腘静脉;内侧支(管径1.95 mm)向上内侧上行,于肱骨内侧髁上方10.81 cm汇入大隐静脉主干(图1c)。

## 3 讨论

本例由于右侧小隐静脉主干注入大隐静脉,只有一细支注入腘静脉,致使小隐静脉向心回流的主要通路变细增长,阻力增加,小隐静脉压力增加,使得静脉壁变弱,容易导致静脉回流不畅,是导致静脉曲张发生的先天因素,曲张的静脉在小腿远比大腿明显。本例变异情况可给临床诊断、检查浅静脉功能及手术治疗提供参考。左下肢由于小隐静脉直接汇入大隐静脉,在手术结扎大隐静脉治疗浅静脉曲张时,应连同大隐静脉五大属支一起结扎[3-4]。另外,小隐静脉原位下肢动脉旁路术是一种治疗下肢动脉硬化闭塞、血栓闭塞性脉管炎的理想术式,使用这一术式时,要充分考虑到小隐静脉的走行及注入变异。

[参考文献]

[1] 付 乙. 小隐静脉过度伸长与下肢静脉曲张-小隐静脉直接汇入大隐静脉一例[J]. 四川解剖学杂志,2001,9(1):65-66.

[2] 涂江义. 小隐静脉的变异报道1例[J]. 泸州医学院学报,2004,27(5):451.

[3] 蔡 理,韩 晶,曾 泉,等. 右侧小隐静脉汇入大隐静脉1例[J]. 咸宁学院学报(医学版),2008,22(1):15.

[4] 张廷才,司道文,刘学钩,等. 股深动脉的穿动脉发出臂下动脉并多处变异一例[J]. 解剖学杂志,2008,31(5):635.

(编辑:余汇洋)