维普资讯 http://www.cqvip.com

1.2 治疗方法

治疗组:在全身营养支持,输液纠正水电失衡及预防感染的基础上;思密达6 g、山莨菪碱10 mg、云南白药8 g,地塞米松5 mg,将上述药物混匀加入0.9%氯化钠200 mL内,每日早晚各灌肠1次。灌肠时病人取左侧卧位,注药深度15~25 cm,温度35 ℃,时间30 min,注药后令病人改为平卧位休息1 h。每4周为一疗程。对照组:用柳氮磺胺吡啶1 g,每日4次,另服泼尼松10 mg,每日3次,使用1个月。

1.3 疗效评价

主要根据腹痛、腹泻、里急后重、粘液脓血便等症状改善,和电子肠镜、钡剂灌肠检查进行评价。治疗1个月后,病人腹泻、里急后重、粘液脓血便消失,腹痛也有所好转,电子肠镜见粘摸充血、水肿消失,未见糜烂及小溃疡,并无脓性分泌物即为有效。

1.4 统计学方法

应用SPSS 10.0统计分析软件,对结果进行分析处理。所有数据用$\bar{x} \pm s$表示。两组间比较采用χ^2检验及t检验。

2 结果

治疗组有效率为91.9%(68/74),对照组有效率50.0%(32/64);两组比较差异有统计学意义($P<0.01$)。治疗组中有3例发现恶心、呕吐症状,给与爱茂尔肌注及口服维生素B_6后缓解;有3例出现心悸口干症状,给与心痛定舌下含服后缓解。对照组也有1例患者出现恶心、呕吐症状治疗好转;另有1例因出现白细胞减少,故予停药,其余无不良反应。

3 讨论

思密达的成分是双八面蒙脱石,该药不被吸收而对结肠粘膜有很强的覆盖能力;它能与糖蛋白结合提高粘摸屏障对攻击因子的防御功能,故可避免肠腔各种消化残余物和细菌产生的毒素对肠粘摸的损伤;该药还不影响肠粘摸对水的吸收,能减少结肠因毒物作用产生的激惹[2-3]。山莨菪碱为胆碱能神经阻滞剂,能抑制平滑肌收缩,减少和减轻腹痛,云南白药则有止血,加之地塞米松有脱敏减轻肠粘摸水肿等,故将上述药物联合应用灌肠使溃疡性肠炎尽快好起来。本组资料显示采用灌肠方法治疗溃疡性肠炎,可以让药液大面积接触肠粘摸,直接发挥治疗作用,优于口服或静脉给药。值得注意的是:在用药过程中,个别病例出现恶心、心悸、白细胞减少等症,故要求严密观察,防止其他并发症发生。

总之,采用思密达、山莨菪碱等联合用药灌肠治疗溃疡性肠炎操作简便,安全有效,并且价格低廉,便于基层医院推广应用。

[参考文献]

[1] 任爱宜.思密达与山莨菪碱防治红霉素副作用疗效观察[J].中国冶金医学杂志,2006,23(2):208.
[2] 杨秋云.思密达等保留灌肠治疗溃疡性结肠炎的护理[J].国际护理学杂志,2007,26(8):823-824.
[3] 刘爱枝,罗秀娟,林晓芳.中药灌肠在临床应用中的改进[J].局解手术学杂志,2007,16(1):62.

(编辑:郭光金)

97466X
08,017,003

《局解手术学杂志》简介

《局解手术学杂志》是全国唯一的局部解剖学与临床外科手术学相结合的杂志。国际标准刊号:ISSN1672-5042,国内统一刊号为:CN50-1162/R,双月刊,主要刊登人体解剖学、应用解剖学、断层解剖学及临床外科手术学的基础理论、实验及临床研究。设置的栏目有:专家论坛、科研论著、教学研究、经验交流、综述与讲座、短篇与个案、手术方法改进、国内外本领域研究动态等。本刊稿件刊出周期短,大16开,72页,彩色铜版纸印刷,每逢双月的25日出版,每册定价:12.00元,全年72.00元(含邮资费)。

地 址:重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号第三军医大学局解手术学教研室《局解手术学杂志》编辑部
联系人:左艳芳 **邮 编**:400038 **电 话**:023-68752251,68752250
传 真:023-68752250 **E-mail**:guogjin@yahoo.com.cn
敬告订户:本刊由重庆五湖印务有限公司承印,如有印刷和装帧质量不合格者,请直接寄回公司更换
地址:重庆市高新区石桥铺六店子1号 电话:023-68620167 邮编:400041