维普资讯 http://www.cqvip.com

头静脉变异1例

潘 征[1]，卢 涛[2]，姚 琦[2]，吴杨霄[2]，张 伟[3]（第三军医大学：1. 训练部教务处；2. 学员旅5队；3. 基础医学部解剖学教研室，重庆 400038）

[关键词] 头静脉；变异；解剖学
[中图分类号] R322.123 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2007)02-0135-01

头静脉汇入腋静脉变异较少见，头静脉汇入腋静脉的属支胸腹壁静脉尚未见报道。作者在解剖一老年男性尸体标本过程中，发现头静脉变异一例，现报道如下。

1 材料与方法

男性尸体标本一例，年龄约60岁，身长167 cm。常规方法解剖显露上肢皮下组织及浅静脉，见右头静脉由掌背侧静脉网起始，绕过前臂桡侧至前臂掌面，向上至肘关节下侧与肘正中静脉和贵要静脉交通，且在此有一浅层分支绕至肱三头肌外侧头与长头之间与上臂的深静脉相通，而不是在前臂与深静脉相通，之后头静脉上升至肱二头肌与肱桡肌之间，经过前臂外侧皮神经浅面，向上循肱二头肌外缘向上，并且在此段，头静脉有6.3 cm的栓塞。之后头静脉变细，当其行至腋窝底时穿深筋膜，而不是由三角肌胸大肌间沟穿深筋膜，之后汇入胸腹壁静脉，而不是直接汇入腋静脉或锁下静脉。此汇入点与胸腹壁静脉汇入腋静脉的汇入点相距约2.4 cm。在上臂的头静脉并无其他属支（图1）。




图1 右头静脉（→）变异照片

2 讨论

根据《中国人体质调查》[1]对头静脉末端注入不同静脉的分析，此例变异不属于其中五种类型之一，介于Ⅰ型（腋静脉型）和Ⅴ型（缺如型）之间，是一极少见变异类型。临床上由于头静脉的起始位置十分恒定，位于桡骨茎突背侧的浅筋膜内，即使在此看不见头静脉也可以在这里作头静脉切开。当肱静脉有血栓性静脉炎时，头静脉就成为上肢重要的血液回流途径。因此，在乳腺癌根治术或肩关节手术时，均应妥善保护好头静脉，不可盲目切断、结扎，以防止血液回流障碍。此外，在三角肌胸大肌间沟内，头静脉易于显露，可作紧急静脉切开之用。在现代外科手术中，头静脉常用作心导管插入静脉，导管通过头静脉、腋静脉和锁骨下静脉然后通过上腔静脉进入心脏。本例变异将影响头静脉在临床上的应用，且此变异使贵要静脉的外径变粗，提高了临床实施PICC置管术的成功率[2]。

[收稿日期] 2007-01-23 [修回日期] 2007-03-05

[参考文献]

[1] 中国解剖学会体质调查组. 中国人体质调查[M]. 上海：上海科学技术出版社，1986.
[2] 聂绪发，严振国. 临床应用表面解剖学[M]. 上海：上海科学技术出版社，1998.115.

（编辑：余汇洋）

胰腺转移性鳞癌1例

杨达荣，徐红梅（合川市人民医院病理科，重庆 合川 401520）

[关键词] 胰腺；鳞状细胞癌；病理诊断
[中图分类号] R735.9 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2007)02-0135-02

胰腺恶性肿瘤中绝大部分是胰腺导管腺癌，其它少见类型如囊腺癌，乳头状癌，恶性胰岛细胞瘤等。胰腺原发性鳞状细胞癌临床十分罕见[1-2]。本院于2006年3月收治了一例胰腺转移性鳞癌，现报道如下。

1 临床资料

患者男性，54岁。因无明显诱因出现左侧腹部持续性隐痛2月余，以“腹部包块：①胰腺肿瘤；②胰腺炎”于2006年3月2

[收稿日期] 2006-12-23 [修回日期] 2007-01-30