维普资讯 http://www.cqvip.com

9-7466
R
2004.1316

鱼胆中毒的住院患者，共64例，男28例，女36例，年龄12～75岁，平均38.5岁。

1.2 方法

通过详细复习病例，从以下几方面进行观察和分析：①鱼胆中毒的临床特点；②实验室检查；③治疗及预后。

2 结果

64例鱼胆中毒中以26～35岁年龄组病例最多，为22例，占总人数的34.3%；农民发病例数最多，为40例，占总人数的62.5%；由草鱼胆引起中毒者最多，为56例，占总人数的87.5%；鱼胆毒性发作0～4 h发病58例，占总人数的90.6%。鱼胆中毒的临床症状及体征极为复杂，见表1。

表1 鱼胆中毒的临床症状及体征

症状及体征	例数	%
消化系统症状	64	10
少尿、血尿、水肿	56	87
头昏(痛)、神志不清	40	62
肝、肾区叩(压)痛	36	56
皮肤、巩膜黄染	32	50
血压增高、四肢抽搐	18	28
心悸、紫绀	18	28
肺部罗音	10	15
呕血、黑便	10	15

以上所有症状及体征均在1～14 d内发生。64例患者均在入院时进行肝、肾功能及大、小便检查，32例患者进行心肌酶谱检查。所有患者均有血AST、ALT、TIB、Bun、Cr异常；40例患者尿RBC或Pr增高。32例患者进行心肌酶谱检查，26例LDH、CPK异常。64例鱼胆中毒患者临床诊断一经确立，除3例给予一般的对症、支持治疗，余61例均采用血液透析或腹膜透析治疗，64例患者中有50例治愈，12例好转，2例死亡(均死于急性肾功能衰竭合并呼吸功能衰竭)。鱼胆中毒的治疗时间早晚与其预后尤为相关，见表2。

表2 鱼胆中毒的治疗时间与其预后的关系

中毒后救治时间	住院日数	并发症例数	死亡人数
< 12 h	10～20	1	0
> 12 h	15～40	5	2

3 讨论

经研究表明，鱼胆中毒以中青年居多，而农民患者最多，这可能是由于城乡医学知识的差距造成，因此，应加强农村中毒知识的宣教，提高防毒意识。鱼胆毒性发作时间90.6%为0～4 h，且临床表现极为复杂(见表1)，不仅肝、肾有损害，心、脑、肺均有一定的损害，在1～14 d内均可发生。各项化验指标均提示肝、肾及心脏、消化道的损害，这就表明未出现临床症状时，器官功能已受损。2例死亡，均死于急性肾功能衰竭合并呼吸功能衰竭，这些提醒医护人员在鱼胆中毒的抢救上要做到早、快、全。早：即在病人入院后尽早完成各项检查，及时制定诊疗及护理方案。快：根据病情尽快进行血液透析或腹膜透析治疗，快速排毒。全：全面监测患者的各项功能指标，及时发现，及时处理，预防并发症的发生。从表2中可以看出，救治时间越早，病人的康复时间越短，并发症发生率越小，死亡率越低。可见鱼胆中毒的急救极为重要。与此同时，要做好患者的心理护理及出院指导，从而促进疾病的早日康复，预防疾病的发生。

(编辑：黄春霞)

《局解手术学杂志》简介

《局解手术学杂志》是全国唯一的局部解剖学与临床外科手术学相结合的杂志。国际标准刊号：ISSN 1672－5042，国内统一刊号为：CN50－1162/R，双月刊，主要刊登人体解剖学、应用解剖学、断层解剖学及临床外科手术学的基础理论、实验及临床研究。设置的栏目有：专家述评、科研论著、教学研究、经验交流、综述与讲座、短篇与个案、手术方法改进、国内外本领域研究动态等。本刊稿件刊出周期短，大16开，72页，彩色铜版纸印刷，每逢双月的25日出版，每册定价：12.00元，全年72.00元(含邮资费)。

地 址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号第三军医大学局解手术学教研室《局解手术学杂志》编辑部

联系人：张天飞 同志收 **邮 编**：400038 **电 话**：023－68752251，68752250

传 真：023－68752250 **E-mail**：guogjin@yahoo.com.cn

敬告订户：本刊由重庆五湖印务有限公司承印，如有印刷和装帧质量不合格者，请直接寄回公司更换

地址：重庆市高新区石桥镇白合村桃子林社 **电话**：(023)68662064 **邮编**：400041