维普资讯 http://www.cqvip.com

局解手术学杂志 2004年第13卷第3期
J Regional Anat & Operative Surg,2004,Vol.13,No.3

多发性骨软骨瘤致左桡骨头脱位1例

陈志中[1]，李云波[2]
（重庆市长寿区中医院：1.骨科；2.放射科，重庆 401220）

[关键词] 骨软骨瘤；桡骨头；脱位
[中图分类号] R738.1；R274.21 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2004)03-0212-01

1 临床资料

患者，女，13岁，左肘渐进性骨端突起伴左前臂弯曲畸形、功能障碍5年余就诊。患者在7~8岁时发现左肘关节骨端突起，否认外伤史，在当地卫生院曾拍左肘X线片诊断为"左桡骨头脱位"，未能复位。5年来左肘关节骨端突起和左前臂弯曲畸形逐渐加重，活动差。查体：一般状态好，心肺未见异常，左桡左肘关节骨端骨头向外后脱位于肱骨髁上后外皮下，左前臂向桡侧弯曲短于右侧，左腕关节向尺侧显著倾斜，左肘及前臂活动受限，右肘及前臂未见异常；左上臂近端、左小腿近端内侧、右大腿远端内侧、右小腿远端前外侧可见并触及骨性肿块，无压痛。前臂X线正位片显示尺骨远端增粗变宽，骨皮质变薄，侧位片有两个近似半球形肿块，分别向掌侧和背侧突出，略呈哑铃状。基底中心部松质骨与髓腔密度接近，有光整的薄层外壳与正常骨皮质延续，边界清楚，无骨膜反应。尺骨缩短，桡骨弯曲，桡骨远端长于尺骨2 cm，下尺桡关节脱位。桡骨头向后外脱位高于尺骨冠状突3.5 cm。其余部位X线片显示：双肩胛骨，双肱骨近端，双髂骨嵴，双股骨近、远端，双胫腓骨近、远端均有大小不等的骨赘突起。右尺桡骨未见异常。对左股骨远端肿块行针穿活检，病理诊断为骨软骨瘤。追问家族中无类似病人，患儿母亲放弃治疗。

2 讨论

多发性骨软骨瘤的典型发病部位是股骨、胫骨、腓骨的远近端及肱骨近端，常对称发病，有家族病史，男性多见，如无任何症状无特殊治疗，出现毗邻血管、神经受压症状可切除局部肿瘤，畸形严重需行矫形术，预后较好，仅有5%恶变率[1,2]。本例伴随左尺骨远端发病并致桡骨头脱位较少见，亦无明确家族病史，需注意的是，尺桡骨X线片应充分显示尺、桡骨远近端，以免漏诊；如在发病之初能给予及时分期矫正可望保存肘和前臂功能。

[参考文献]

[1] 胥少汀，葛宝丰，徐印坎. 实用骨科学[M]. 第2版. 北京：人民军医出版社，1999.1323-1324.
[2] 张德强，郝敬东，张锡庆，等. 多发性骨软骨瘤病[J]. 中华小儿外科杂志，2003，24(2)：182-183.

[收稿日期] 2004-03-20 [修回日期] 2004-04-09

（编辑：蒋登金）

43例青年自发性气胸的临床分析

黄自清，殷建兵，钟俊波
（自贡市第三人民医院胸心外科，四川 自贡 643020）

[关键词] 青年；自发性气胸；临床分析
[中图分类号]R161.5；R561.4 [文献标识码]B [文章编号]1672-5042(2004)03-0212-02

1995年1月至2003年3月，我科共手术治疗青年自发性气胸43例。现就青年自发性气胸发病的病因和手术指征进行讨论如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

43例自发性气胸中，男性38例，女性5例。发病年龄17~35岁，平均年龄24岁。右侧8例，左侧35例。主要临床表现为胸痛、气促、胸闷。发病情况为：首发病例4例，二次发病32例，发病三次以上7例。发病后置胸腔闭式引流40例，持续置管时间最长为43 d，从发病至手术时间为3~45 d不等，平均为26 d。

1.2 手术方法

43例均行手术治疗，其中21例为开胸手术，22例在胸腔镜辅助下手术。手术发现：肺大泡破裂41例，肺尖部表面瘢痕1例，胸腔顶部粘连带将肺尖表面撕裂漏气1例。其中肺大泡基底部周围有瘢痕样变2例，病变部位均在肺尖，多数有肺小泡

[收稿日期]2004-02-28 [修回日期]2004-04-29