维普资讯 http://www.cqvip

局部注入3%碘酊治疗阴道壁囊肿12例分析

黄 莘[1]，祝美洲[1]，赵 丽[2]
（鞍山钢铁集团公司立山医院：1.妇产科；2. 医教部，辽宁 鞍山 114032）

[关键词] 阴道壁囊肿；3%碘酊；局部注射
[中图分类号] R711.73 [文献标识码] B [文章编号] 1672－5042(2004)05－0353－01

阴道壁囊肿的治疗方法很多，如囊肿切除、囊肿造口、局部注入无水乙醇等，我院妇产科门诊2000年1月至2001年12月共收治12例阴道壁囊肿患者，采用3%碘酊局部注入治疗阴道壁囊，取得了满意效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本组病例12例，年龄26～48岁。普查发现8例，自己发现2例，以性生活困难为主诉就诊发现2例。囊肿直径3～5 cm。

1.2 方法

患者排空膀胱后取截石位，外阴、阴道常规消毒，铺无菌巾，充分暴露囊肿。9号针头接10 ml注射器，从囊肿最低部位穿入，抽净囊液，保留针头不移位，取下针筒，注入3%碘酊。注入抽出量的1/3左右，40 min后抽出注入的3%碘酊。患者休息1 h，无异常后离院。治疗后一周、一个月后未治愈者可再行第二次治疗。

2 结果

患者术后一周来院复查，局部均无红肿，无硬结，囊肿完全消失10例，治愈率83%；囊肿变小2例，经第二次治疗后痊愈。一个月后来院复查，全部治愈。

3 讨论

3%碘酊有烧灼、凝固蛋白作用，使腺体分泌停止，形成粘边并闭锁囊腔，从而达到治疗的目的。本方法操作简单、安全、可靠，无毒副作用，无需住院，门诊即可治疗。注药时要检查针头在囊腔内方可注药，如出现明显疼痛应停止注药。如抽出脓液，提示有急性炎症，可向囊腔内注入庆大霉素或甲硝唑等药，并全身应用抗生素，待炎症消失后再用3%碘酊治疗，碘过敏者禁用此方法。

（编辑：左艳芳）
[收稿日期] 2004－08－10 [修回日期] 2004－09－13

重型颅脑损伤并发肺部感染的原因探讨及护理

陈玉兰
（佳木斯铁路医院，黑龙江 佳木斯 154002）

[关键词] 颅脑损伤；肺部感染；护理
[中图分类号]R651.1；R248.1 [文献标识码]B [文章编号]1672－5042(2004)05－0353－02

我院于2000年2月至2003年2月收治了184例重型颅脑损伤患者，其中36例并发肺部感染。本文对重型颅脑损伤并发肺部感染的原因进行探讨分析，现报告如下。

1 临床资料

本组重型颅脑损伤病人184例，其中并发肺部感染者36例，发生率为20%。36例并发肺部感染患者中，男性33例，女性3例，年龄9～68岁。损伤类型：颅内血肿、硬膜下血肿20例，脑挫裂伤11例，脑干损伤5例。住院时间7～90 d，GCS评分均在8分以下，气管切开15例。恢复良好23例（占64%）；死亡13例（占36%）。直接死于肺部感染者9例。本组病人意识障碍较重，因机体反应能力和防御能力降低使早期肺部感染征象不易被发现，加之肺部X线改变出现较迟，故诊断较困难。分析本组资料，感染早期均有脉博增快、呼吸浅快、呼吸音粗糙、白细胞升高、分叶核左移、体温升高等表现。

2 原因分析

重型颅脑损伤并发肺部感染的原因总结如下：①严重的颅

[收稿日期] 2004－05－28 [修回日期] 2004－07－21