维普资讯 http://www.cqvip.com

胸壁结核患者围手术期护理

钱冬梅* 孟宪华*

胸壁结核是一种继发性病变，治疗与护理宜整体兼局部原则，即在手术治疗和全身抗痨的前提下，配合休息、营养和局部制动。1997年2月至1999年2月我院胸外科共收治31例胸壁结核患者，经随访观察1年半到2年，都取得较好疗效，现将其手术配合护理体会如下。

一、资料与方法

1.临床资料：本组患者共31例，男12例，女19例，年龄在20～69岁之间，均经X线、CT或MRI检查确诊入院。

2.手术方法：一般采用静脉复合麻醉和硬膜外麻醉的两种方法，局部清除病灶，如有肋骨破坏则切除腐蚀的肋骨，病灶切除后，术区用0.5%碘伏溶液冲洗，然后用温盐水冲洗后，链霉素粉剂涂抹，清点器械和敷料后，缝合切口。

3.手术配合：(1)术前准备：单极电刀、温盐水、常规器械包、肋骨器械、吸引器、调节手术间温度至22～27℃，并保持稳定，为手术的顺利进行创造良好的环境条件。(2)术中配合：①协助麻醉师做好硬膜外(或静脉复合)麻醉，用16号留置针行静脉穿刺，根据年龄、病情调节输液速度，并保持输液通畅。②协助病人取适当的平卧位或侧卧位，巡回护士要密切观察生命体征的变化，及时配合麻醉师进行处理，密切注意手术过程，迅速供给术中所需物品。③器械护士要熟悉此类手术的方法、要求，根据解剖部位和手术医生的操作，准确无误地传递器械及其他术中用品，器械护士主动协助暴露术野以利于手术者操作。④手术开始、关闭切口前，巡回护士与器械护士要严格核对器械、敷料及一切用品，认真执行"三查七对"制度，严防差错事故的发生。

二、结果与讨论

手术室与病室护理人员积极配合，深入了解情况，收集资料，加强心理护理，消除患者的紧张、惊恐和担心，护士应主动介绍成功病例，将有丰富经验的医生、病室护士长和责任护士及医院的各种与病人有关的环境介绍给患者，同时还积极进行健康教育，教病人做有效的咳嗽等，并在护理过程中，给予亲切、耐心的疏导，使患者消除了心理负担，积极配合，较好地接受了手术前的各项准备和治疗，同时也较快地掌握了术后的各种康复技能。手术室护士应熟悉手术过程，才能做好术中配合，密切观察病情，才能避免不良后果。洗手护士应熟悉手术解剖部位，掌握手术步骤，各种器械的手术方法、性能；巡回护士要密切注意手术过程，配合麻醉师用药。手术者、洗手、巡回护士、麻醉师相互密切配合，才能保证手术的顺利进行。

关于特殊用药指导：该病需联合、足量、规律、早期、全程用药，术前至少使用抗痨、消炎药两周，以防止病灶扩散，向患者宣教药物的名称、剂量及使用，给药的重要性及方法，术前抗痨药足量冲击治疗时可出现恶心、呕吐、耳鸣、听力下降等，以及肝功能和耳神经损害的副作用，指导病人如出现上述症状，应及时告诉医护人员，以便采取相应措施或更换药物，同时使患者了解结核病常用的药物名称，所用药物及剂量，告诉病人应在医生指导下使用，不擅自停止或加减剂量，以防结核病灶复发。

(收稿日期：2002－05－08)

* 作者单位：154002 黑龙江省佳木斯市结核医院

单臂外固定架治疗110例老年人股骨粗隆间骨折

吕荣先* 周宝才**

股骨粗隆间骨折是老年人髋部常见的骨折，选择治疗方法时，多从手术风险程度来考虑术式。我院于1993年8月至2002年8月，9年间共收治110例60岁以上股骨粗隆间骨折患者，均用单臂外固定架固定，效果满意，现报告如下。

一、资料与方法

1.临床资料：股骨粗隆间骨折患者110例，男性80例，女性30例；年龄60～86岁，平均73.6岁。既往并存病者98例，占87%，包括有高血糖34例，其中有糖尿病病史28例，既往无糖尿病史6例；有心血管、肺部疾病70例和脑血管意外偏瘫2例；不同程度老年痴呆者4例。按Evan's分型，Ⅰ类82例，其中Ⅰ

* 作者单位：157000 黑龙江省牡丹江市骨科医院
** 牡丹江市解放军209医院外二科