维普资讯 http://www.cqvip.com

同看法。为进一步证实曲马多对呼吸影响是否与吗啡类药物相当，本研究拟用曲马多介入颌面、整形外科接受手术治疗的婴幼儿麻醉中。经临床对比观察发现，曲马多经过本文给药途径与剂量，对小儿呼吸几乎无抑制作用，而吗啡类药物对小儿呼吸抑制程度表现较明显。虽然小儿于麻醉后各组与术前相比 SpO_2 值均呈下降趋势，但组间相比证明并非由曲马多引起，而是由于氨胺酮麻醉后，在非吸氧状态下，各组小儿 SpO_2 值均有变化，尤其 B_1 组术前应用哌替啶后 SpO_2 值下降较明显。由此说明曲马多在小儿麻醉中应用对通气功能并无妨碍，但同时提示我们小儿在氯胺酮麻醉下需吸氧，以防术中由麻醉药引起的小儿低氧血症。至于曲马多对小儿其他方面的影响，我们正待进一步观察研究，以期能更广泛应用于儿麻领域。

（收稿：2001-03-26）

局部转移皮瓣修复骶部褥疮二例

魏喜全* 曹长远* 艾深海*

一、临床资料

病例1 女性，18岁。吸毒一年余。因在家戒毒服镇静剂三唑仑10片（0.25mg/片），昏睡三天，大小便失禁，清醒后发现骶部皮肤水泡，溃烂二十天，于2000年6月2日入院。骶部创面5cm×7cm×1.5cm，边缘有少许污浊肉芽，中部有黑色坏死干痂，似皮革样、痂下积脓，脂肪液化，并伴有恶臭，剪去坏死干痂后，发现创口深达骨质，呈潜行性溃烂，并有部分坏死肌肉，整个伤口呈"夹心饼干"样。入院后经彻底清创，局部肌瓣填塞空腔及皮瓣转移覆盖修复，7天拆线，伤口Ⅰ期愈合，半年后随访效果满意。

病例2 男，20岁。吸毒半年余，欲戒毒而服镇静剂安定30片后昏睡，两天后发现骶部皮肤起水泡，溃破，糜烂一月余。于2000年7月10日入院。查骶部创面6cm×8cm×1.5cm，边缘肉芽苍白，其中心为凹陷黑色坏死干痂，痂下积脓，脂肪液化，并有恶臭的脓性分泌物。手术处理同第一例，随访半年效果满意。

二、手术方法

在腰麻下进行，距创缘外0.2cm处切除污秽肉芽及炎性组织，直达健康筋膜层，发现其底部肌肉大块坏死，并潜行深入左侧臀大肌深面，因清创困难将切口边缘向左侧延伸5cm，并掀起皮瓣，彻底暴露坏死臀肌，直达骶骨棘突，切除坏死肌肉后彻底清洗止血，将左侧臀大肌的一部分肌肉游离，形成带蒂肌瓣填入创口底部，然后将所形成的局部皮瓣转移修复创面。

三、结果和讨论

1）褥疮多发生于长期卧床且不能翻身的昏迷或截瘫病人。本文报道两例，均由于欲戒毒而服用过量镇静剂，致长时间昏睡，局部受压而产生褥疮。2）此类病人因能自由下地行走，按理用伤口换药，引流，很易自愈。本文两例均因伤口深大，坏死组织多，肉芽生长极慢，长期换药无效，感染较重如不及时手术清创，封闭创面，就很难消灭感染。3）褥疮的手术植皮如不解除发生的原因，手术后仍可再发生，远期效果一般不好，但此两例手术后能下地行走，解除了形成褥疮的原因，所以远期效果甚佳。

* 作者单位：400038 重庆市第三军医大学门诊部

（收稿：2001-04-01）

浅谈手术室护士的护理医德

姜振环* 佟秀凤* 张 霞*

手术室是手术患者抢救和治疗的重要场所，手术是现代医学中治疗外科疾病的重要手段，手术室护士是协助外科医师进行手术治疗的重要助手。手术成功与失败的关键不仅在手术过程中的技术，而且还取决于手术室护士的护理道德和手术护理水平。虽然患者在手术室手术治疗时间不长，但对疾病的治疗治愈起关键性作用。手术室护士必须有高尚的医德，精湛的技术，协作的精神。这样，才能完成好手术室护理工作。以下就手术室护士的医德问题谈几点粗浅体会。

一、护理医德作用

护理医德是衡量护士护理道德水平的标准。手术护理道德是以革命的人道主义精神，高度的责任心，高水平的手术护理技能，优质的服务，全心全意为患者创造一个适合手术的心境与环境，促进病人手术治疗后早日康复为最高准则。当今，手术室护士仍然要向南丁格尔学习，做白求恩式的白衣战士。

* 作者单位：154002 黑龙江省佳木斯大学第一附属医院医学手术学教研室