维普资讯 http://www.cqvip.com

中国局解手术学杂志 2002年第11卷第2期
Chin J Regional Anat & Operative Surg, 2002, Vol. 11, No. 2

临床护理工作中护理道德

姜振环* 张 霞*

随着医学科学的不断发展，医学模式的转变，临床护理工作也从过去的以疾病为中心转变为以患者为中心，从只注意患者的身体疾病扩展到关心患者的身心健康。临床护理人员不但要具有高尚的护理道德，还要有高水平的护理技术及护理基础理论知识和其他相关的边缘学科的知识，以适应新世纪的要求，如何将好的道德行为贯穿于临床护理工作中就更显得尤为重要，本文就临床护理工作中道德的体现，谈几点粗浅的看法、供同道参考指正。

一、热爱临床护理专业

做为一名临床护理工作者，必须做到热爱本职工作，具有崇高的奉献精神，要向白求恩同志那样，对患者极端热枕，对工作极端负责，对业务精益求精，不断更新知识，提高业务水平，同时要加强自身素质建设，保持身体健康、稳定心理素质，才能顺利完成好临床护理工作。

二、忠于临床护理专业

临床护士担负着大量具体的护理工作，一切处理都要通过护士的双手去完成，这就要求护理人员在任何情况下都必须从患者出发，为患者着想，忠于患者利益，理解患者，一丝不苟，认真负责地完成各项护理工作，减轻患者的痛苦。一名合格的护士，要有高尚的修养和良好的心理品质。护士高尚的道德行为是美好心灵的写照。精湛的技术、丰富的知识、端庄的仪表会使患者信赖、尊重、树立战胜疾病的信心，让患者在愉快的心境中治疗乃至治愈疾病。

三、临床护理人员的道德要求

临床护士与患者接触是最前位、最直接的，做为一名合格的护士，不仅要全面细致地观察了解患者的病情变化，而且还要有强烈的责任心，一切从患者利益出发，以饱满的热情去关心、了解患者、满足患者的心理需求，建立良好的护患之间的信任关系，有助于治疗效果达到最理想的程度。

四、临床护理工作的服务道德

临床护理人员的服务对象是患者，护理质量的优劣直接影响整个治疗过程，在临床工作中，优质服务要靠护理人员从小事作起，细心照料和心关体贴患者，用高度的同情心，全心全意为患者服务。一名护士掌握了先进的护理技术，并在工作中能得心应手地服务于患者，使患者减轻痛苦，并在护士的服务中得到一份安康、一片安静，护士也将在为患者服务过程中实现自身价值。

（收稿日期：2001-12-25）

* 作者单位：154002 黑龙江省佳木斯大学附属第一医院手术学教研室

短暂性脑缺血发作的防治及其护理

刘玉荣* 张丽杰* 高凤荣*

短暂性脑缺血发作（TIA）是急性缺血性脑血管病之一。因其临床症状及体征恢复极快，常不引起人们的重视。临床研究表明，TIA发生后一年内，发生完全性卒中的危险是无TIA史同类人群的12倍，所以，对TIA的防治及护理应引起重视，以便降低脑卒中给家庭和社会带来的负担。临床工作中，我们通常采用四种对策。

一、TIA的三级预防及治疗

TIA发生后的早期或急性期，常采用肝素抗凝，即肝素12500单位溶于生理盐水500ml中，10～20滴/min静脉滴注，并定时采血监测凝血酶原时间、依次调整滴速，直到肝素化，以后可按8～10滴/min维持静脉滴注24h，连用5～7d后，改用口服抗血小板药或抗凝药。也可选择性地应用降纤酶或溶栓药。在用药期间，护士应严密观察病情变化，监测静脉滴注速度，掌握好采血时间、观察皮肤粘膜牙龈有无出血倾向，协助患者入厕、活动时，应防止受伤。适时地向患者讲解关于疾病的知识、合理治疗的作用以及今后应从哪些方面注意，以防止发生完全性卒中。

二、TIA的二级预防

TIA发生后1年内，发生完全性卒中的危险是无TIA史同类人群的12倍，因此采取有效的二级预防措施并持续数年，是当前的主要任务。主要对策是干预危险因素，其次是对TIA患者及高危人群长期应用阿斯匹林。近代流行病学调查研究表

* 作者单位：黑龙江省佳木斯大学附属第一医院