维普资讯 http://www.cqvip.com

能、胃肠功能衰竭较多。每增加一个SIRS标准项，其死亡率都有显著差异（$P<0.05$），说明全身炎性反应越强、MODS发生率越高，而临床进行的各种治疗，效果往往不佳，这提醒我们要进行早期控制SIRS的治疗，以避免SIRS向MODS的发展[6]。

SIRS为外科临床常见的综合征，它在梗阻性黄疸中的发生率以及与患者预后的关系尚未引起临床医生足够的重视。作者认为要降低阻塞性黄疸病人MODS的发生率，要注意以下几个方面：（1）早期认识SIRS，阻断其发生发展。（2）针对病因进行治疗，早期诊断，早期手术解除梗阻；（3）降低胆红素水平，控制内毒素血症。（4）改善患者的全身情况，以提高患者的抗炎症反应能力。

参 考 文 献

[1] 陈德昌. 多器官功能障碍综合征与感染[J]. 中华医学杂志, 1996;76(4):246-249.

[2] Goris RJA, Cockhors TPA, Nagtink JKS, et al. Multiple Organ failure[J]. Arch surg, 1985;120(10):1109-1113.

[3] Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definitions for the use of innovative therapies in sepsis. The Accp/sccm Consensus conference Committee. American College of Chest Physicians Society of Critical Care Medicine[M]. Chest. 1992;101(6):1644.

[4] Su CH, Peng FK, Lui WY. Factors affecting morbidity and mortality in biliary tract surgery[J]. World J Surg, 1992;16(3):516-540.

[5] Clements WDB, Diamond T, McCrory Dc, et al. Biliary drainage in obstructive jaundice: experimental and clinical aspects[J]. Br J surg, 1993;80(7):834-837.

[6] 盛志勇. 多器官功能障碍综合征的回顾与展望[J]. 解放军医学杂志, 1996;21(1):3-5.

文章编号：0253-3626(2002)02-0192-01

胃癌伴发胆囊癌1例报道

曾 超，王继见 （重庆医科大学第二临床学院肝胆外科 重庆 400010）

【中国图书分类法分类号】R735 【文献标识码】A 【收稿日期】2001-03-29

1 病例报告

患者，男，74岁，因“B超发现胆囊结石十余年，发现胆囊结石伴息肉4个月”，于2001年3月6日入院。发现结石以来，无明显自觉症状，皮肤巩膜未出现黄染，体重无明显下降，无呕血、便血、黑便史。家族史无特殊，体格检查：T36.4℃，P68次/min，R18次/min，BP14/9kPa。心肺腹及其他脏器无阳性体征发现。辅助检查：B超提示胆囊结石、胆囊息肉，胸片、心电图、血图分析、肾功生化、肝功十四项、尿分析、大便常规等均无明显异常。综合以上病情，诊断为：胆囊结石伴息肉。遂于2001年3月8日在全麻下行胆囊切除术。术中见胆囊肿大，与周围组织粘连，胆囊颈部可扪及结石，约0.7cm × 0.7cm大小，胆总管约1.2cm粗细，行胆总管造影显示下段通畅，遂结扎胆囊管，剥离胆囊，见胆囊中部变细、变硬，周围有数个米粒大小硬节，将胆囊分成两个大小约 4cm × 5cm和3cm × 3cm的囊腔，腔内可扪及大小约0.4cm × 0.5cm、0.7cm × 0.7cm、1.0cm × 1.2cm的结石三枚。切下胆囊送冰冻切片提示恶性，遂行腹腔探查，见胃小弯后壁有大小约 5cm × 5cm的硬节，已突破浆膜层，但与周围组织尚无粘连，大网膜可扪及数个肿大的淋巴结，质硬，活动，考虑为胃癌，且伴淋巴结转移。遂行胃大部切除，胃空肠吻合，术后病理报告：(1)胃溃疡型中低分化腺癌，侵润全层，两切端未累及，(大网膜部)慢性淋巴结炎（2/2）。(2)胆囊中高分化乳头状腺癌，部分囊壁组织有癌侵润。病理免疫组化检验报告显示：(1)胆囊中高分化乳头状腺癌，Ki-67(+)、C-erbB-2（+）。(2)胃溃疡型中低分化腺癌，Gst-π(+++)、P-gp(+)、TOPOII(+++)、P53(++)、CEA(++)。由以上情况得出术后诊断：原发性胃癌伴原发性胆囊癌。

2 讨 论

胃癌是我国和世界主要几种常见恶性肿瘤之一，居各类癌症死亡率之首，且男性高于女性。而据文献报道，胆囊癌不论原发或转移癌都很少见，胆囊结石是引起胆囊癌的发病原因之一，但在结石病人中，胆囊癌的发病率也小于1/1000。女性比男性 等于3:1，而本例为男性。原发性胆囊癌几乎均为腺癌，其中60%为硬性腺癌，25%为乳头状腺癌，10%为粘液性腺癌，而本例为乳头状腺癌。本病很少见，且伴发原发性胃癌者极少见。

作者介绍：曾 超（1974- ），男，住院医师，主要研究方向：胃肠外科。