维普资讯 http://www.cqvip.com

别。46,Xi(Xq)的细胞来源可能是着丝点分裂时发生错误,而与另一个丢失了一个X染色体的细胞一起形成了45,XO/46,Xi(Xq)嵌合体[3]。

46,XX又称单纯性腺发育不全患者。本文有5例为此核型。年龄为18～24岁,虽然5例患者核型正常,但她们的临床体征都有不同程度的Turner's综合征的表现,如:身高为1.22～1.40m,肘外翻,第二性征未发育,至今无月经初潮,乳距增宽,腋毛、阴毛缺如,外阴幼稚型。本症的主要发生原因是在胚胎早期卵巢就停止了发育,它属于卵巢发育不良,其原因可能:(1)胚胎早期遭受某种意外损伤,影响卵巢的正常分化发育,但染色体无改变。(2)常染色体隐性遗传所致。

参 考 文 献

1.刘权章等。人类染色体方法学 人民卫生出版社 1989;147
2.张汇泉等.人体畸形学 人民卫生出版社 1986;172

(收稿日期 1999－07－01)

妇血康冲剂治疗药流术后阴道出血观察

临床学院妇产科 周 勤* 卞度宏 李飞浪 朱建华

中图分类号 R737.31

米非司酮配伍米索前列醇终止早孕已在全世界广泛推广运用,并获得一定的成功。据统计,对停经49天内的早孕患者进行药流术,完全流产率在92.8%以上[1]。但流产后出血时间长,平均出血时间14天左右[2]。此外有10%左右出血多于月经量[3]。为了寻求其方便有效的治疗方法,我们于1996年10月～1997年6月,将广西桂林制药厂生产的妇血康冲剂用于治疗药流术后出血,取得了一定疗效,现报导如下。

1 材料和方法

1.1 **研究对象** 停经49天内,经妇科检查及尿或血hCG测定,确诊为早孕且符合米非司酮药物流产条件的健康妇女118例,随机分为实验组60例;对照组58例。两组年龄、药流前月经周期天数、经期天数、孕产次、停经天数等情况,具有可比性($P>0.05$)。

1.2 **用药方法** 全部病人,第1天晨空腹服米非司酮50mg,晚服25mg,连续2天,第3天到医院服米索前列醇600mg,留院观察6小时,在确认胚囊排出2小时内,实验组60例,每例服妇血康冲剂10g,每日3次,连续7天一疗程;对照组58例,每例服益母流浸膏10ml,每日3次,连服7天。

1.3 **随访** 术后第8天、15天及第一次月经来潮复诊,了解出血量、胎物是否排出、药物副反应及月经复潮天数。如出血量多于月经量或经B超证实宫内有胎物残留,则确定刮宫或继续观察。

1.4 **观察指标**

1.4.1 阴道出血量 以本人正常月经量为准加以判断。

1.4.2 阴道出血持续时间 以胚囊完全排出后至阴道出血干净的时间。

1.4.3 第一次月经来潮的时间 以胚囊完全排出后至下次月经恢复时间。

2 结果

2.1 **流产效果** 完全流产治疗组56例(93.9%),对照组53例(91.4%)($P>0.05$)。不完全流产治疗组4例(6.7%),对照组5例(8.6%)。二组流产效果无明显差异。

表1 流产效果比较

组别	总例数	完全流产(%)	不完全流产(%)
治疗组	60	56(93.3)	4(6.7)
对照组	58	53(91.4)	5(8.6)

$P>0.05$

* 女,1967－12出生,主治医师

维普资讯 http://www.cqvip.com

2.2 **阴道出血量** 妇血康治疗组阴道出血量少于月经量者明显多于对照组，差异有显著性($P<0.05$)。

表2 两组阴道出血的情况

组别	总例数	少于月经	月经量	多于月经量
治疗组	60	39*	18	3
对照组	58	27	26	5

* $P<0.05$

2.3 **阴道出血时间** 流产后阴道出血持续时间在一周以内者，治疗组占64.3%，对照组占45.3%，两组有显著差异($P<0.05$)。出血持续时间超二周者，治疗组占1.8%，对照组占11.3%，两组有显著性差异($P<0.05$)；说明妇血康冲剂有明显缩短药物流产术后阴道出血时间的作用。

表3 两组阴道出血持续时间

组别	例数	例数<7d		8－14d		≥15d	
		例	%	例	%	例	%
治疗组	56	36*	64.3	19	33.8	1**	1.9
对照组	53	24	45.3	22	43.4	7	11.3

* $P<0.05$ ** $P<0.05$

2.4 **月经复潮天数** 治疗组平均32.5天，对照组平均34天，两组平均复潮时间无显著性差异。

2.5 **副反应** 两组病人均无一例发生不良反应。

3 讨论

米非司酮配伍米索前列醇用于终止早孕，降低了人工流产并发症的发生，减轻了孕妇的痛苦，深受广大妊娠妇女的欢迎。由于该药存在流血时间较长的缺点，如何有效地解决这一问题，日益受到人们的关注。对此，我们选用具有促进子宫平滑肌收缩，使血管闭合，加速子宫内膜脱落的妇血康冲剂治疗，取得了满意疗效，且使用方便经济。

妇血康冲剂系广西桂林制药厂根据桂西地区民间验方研制而成的纯中药制剂，具有补血活血、祛瘀生新，敛血止血，促进子宫复旧的功效。本组通过妇血康冲剂治疗药流术后阴道出血，与对照组相比，明显减少了出血量及缩短出血时间，值得推广。

参考文献

1.方慧兰，等. 中华妇产科杂志 1997; 32:186
2.桑国卫，等. 临床试验中华医学杂志 1996; 76:325

(收稿日期 1999－01－20)

The observation of the effects of Fu Xue Kang granule on vaginal bleeding after drug-induced abortion

Zhou Qin, et al
Department obstetric and gynecological, college of clinical medicine

To observe the the rapeutic effect of Fu Xue Kang granule on vaginal bleeding after drug-induced abortion. Method: The 118 patients from out- patient department for abortion were randonly assigned to two groups: the treatment group with 60 cases in which each patient was given Fu Xue Kang granule 10 grams, three times per day for 7 days beginning within 2 hours after blastocyst's exclusion and the contrast one in which each patient was given YiMu extract 10 ml tid for 7 days. Results: There were differences between these two groups. Conclusion: Fu Xue Kang granule had significant therapeutic effect on vaginal bleeding after drug-induced abortion, but had no side effect.

KEY WORDS Fu Xue Kang granule; Drut-induced abortion; Vaginal bleeding