维普资讯 http://www.cqvip.com

重庆医科大学学报2000年第25卷第1期（Acta Universitatis Scientiae Medicinae Chongqing）

文章编号：0253-3626（2000）01-0094-01

236例婴儿疥疮临床分析

刘德明，王 华，曾庆玉

（重庆医科大学儿科学院皮肤科 400010）

中国图书分类法分类号：R757.1　　文献标识码：A　　收稿日期：1998-12-28

疥疮近年来在我国流行，发病率明显升高，引起人们的关注。我们在临床工作中发现，婴儿皮肤薄嫩，婴儿疥疮容易引起湿疹样改变和疥疮结节，导致误诊，延误治疗，甚至影响婴儿生长发育。我们于1996年月4月至10月在门诊中对年龄在1岁以内婴儿疥疮进行流行病及临床特征调查、现报告如下：

1 临床资料

1.1 一般资料

236例婴儿疥疮占我院门诊疥疮患者29.3%，男136例、女100例，年龄3月内52例、3~6月57例、6月~1岁127例。病程短的3天，最长6月、平均59天。家住城镇110例、农村126例。

1.2 传染源

父母患疥疮172例(72.9%)，婆爷患疥疮42例(17.8%)、保姆22例(9.3%)。

1.3 皮疹分布

头面部117例(49.5%)、胸部226例(95.8%)，腹部236例(100%)、腋下236例(100%)、会阴部236例(100%)、四肢214例(90.6%)、指间152例(64.4%)、掌跖97例(41.1%)。

1.4 皮疹形态

丘疹236例(100%)、丘疱疹236例(100%)、脓疱40例(16.9%)、疖2例(0.8%)、结痂50例(21.1%)、疥疮结节118例(50%)、湿疹样改变72例(30.5%)。

1.5 症状

晚上哭吵223例(94.5%)、热后抓吵193例(81.7%)、在外误诊为“湿疹”160例(67.8%)。

1.6 实验室检查

部分患儿在体式显微镜下手背部皮肤损害处，可见到隧道。隧道底部丘疹处，用针可挑出疥虫。

1.7 治疗

用5%硫磺霜(我院药剂科配制)，早晚各一次，连用5天一疗程。擦药时用手掌擦皮肤，使药物渗入皮肤角质层，杀灭疥虫。擦药期间不洗澡、不换衣以保持药效。治疗结束后洗澡换衣被，换下的衣被煮沸消毒。经治疗225例(95.3%)一疗程即愈，11例患儿重复一疗程治疗。如有继发感染加用抗菌素治疗。疥疮结节外用复方醋酸曲安奈德溶液(广东湛江向阳制药厂生产)1~2周痊愈。患儿之父母、婆爷、保姆患有疥疮者，必须同时治疗。

2 讨 论

疥疮近年来较为多见，是我科门诊第三位(11.5%)，婴儿疥疮占门诊疥疮患者29.3%。疥疮是由疥螨引起接触传染性皮肤病，常常在家庭中或集体流行，但对婴儿这个特殊人群的有关报告较少，也未引起人们的足够重视，由于婴儿皮肤结构及生活环境的特殊性，临床表现及传播方式上有固有的特点，容易引起误诊。婴儿与外界接触较窄，传染源多与患儿密切接触者有关，检查患儿密切接触者父母、婆爷、保姆患有疥疮，可辅助诊断。本文236例患儿均有疥疮接触史。婴儿皮肤较成人薄嫩，血管系统相当发达，皮疹容易泛发全身，除一般好发于指缝、腕部屈侧、肘窝、腋窝、腰部、下腹部、股内侧、外生殖器等部位[1]，头面部、掌跖均可受累，婴儿疥疮湿疹样改变广泛和严重[2,3]，皮损融合成片。我们有72例患儿皮损呈湿疹样改变，有160例(67.8%)在外误诊为湿疹，应用激素软膏反复不愈，延误治疗。对于头面部“婴儿湿诊”若皮疹比较粗大者、一定要检查全身，可以提高正确诊断率。对皮损广泛散在的小丘疹，再结合病史应首先考虑疥疮。婴儿疥疮的疥疮结节发生率高、Konstantiv D统计疥疮结节发生率6.7%[4]，最常见于腹股沟、阴囊、阴茎、大阴唇、腋下皮肤浅层，约豌豆大小半球形。我们236例患儿中，出现疥疮结节118例(50%)，高于成人疥疮患者，可能是婴儿皮肤薄嫩，皮肤对异物反应强烈所致。婴儿疥疮容易继发感染脓疱疮、疖，严重时可致败血症。

婴儿疥疮在治疗上不能乱用激素软膏以及成人的疥疮药(疥灵霜、10%硫磺软膏)，以免刺激皮肤，吸收中毒。我们应用5%硫磺霜治疗婴儿疥疮效果好。1~2疗程均痊愈。疥疮结节应用安隆(复方醋酸曲安奈德溶液)治疗，结节消退快，无任何不良反应。与患儿密切接触者患有疥疮也应同时进行治疗。患者的衣被应煮沸消毒。

参 考 文 献

[1] 赵 辨，主编. 临床皮肤病学 第二版[M] 南京：江苏科技出版社 1989：465~466

[2] Rook A, et al. Textbook of Dermatology 3rd et[M] Oxfood Blackwell Scientific Publications, 1979;937~942

[3] 周云龙，非典型疥疮的临床和组织病理表现[J] 临床皮肤科杂志，1994；23(6)：348~350

[4].Konstantinov D & Stanowa, Clinical Characteristics of Scabies[J] Dermatologica, 1974;147(6):321~323

作者介绍：刘德明(1945-11出生)，男，副教授