或横部实为随意形皮瓣,是一种轴型皮瓣和随意型皮瓣的复合体,若皮瓣是对侧滑车上动脉供血则为跨区供血的反流轴型皮瓣,血流方向为一侧滑车上动脉→吻合支→对侧滑车上动脉→眶上动脉→颞浅动脉额支,皮瓣远端成活的基础条件是上述血管间有丰富的交通吻合支,此类皮瓣远端不仅存在动脉灌注不足,静脉回流障碍更为明显,当皮瓣长宽比例较大超过4:1时,皮瓣远端易出现循环障碍和组织缺氧,手术时最好在额肌深面分离,以减少破坏血管网较为安全,术后高压氧治疗改善组织氧供及扩张血管、活血化瘀药物如前列地尔、低分子右旋糖苷、654-2改善微循环对皮瓣成活大有益处。

参考文献:

[1] 覃碧金, 罗冠雏, 梁履华, 等. 鼻缺损的修复与再造八例[J]. 中国修复重建外科杂志, 1995, 9(4): 246.
[2] 林瑞杰, 叶亲颖, 黎立军, 等. 额部皮瓣移位联合耳软骨移植的下眼睑一期再造[J]. 中国修复重建外科杂志, 2008, 22(6): 767-768.
[3] 钱云良, 章一新, 杨军, 等. 逆行耳前耳廓复合组织瓣显微移植再造鼻亚结构[J]. 中国修复重建外科杂志, 2006, 20(12): 1186-1188.
[4] 李青峰, 雷华, 顾斌, 等. 额部阶梯状皮瓣与肌、皮双瓣鼻再造术[J]. 中华整形外科杂志, 2004, 20(5): 351-353.
[5] 陈宗基, 吴念, 陈美云, 等. 眶上动脉跨区供血的反流轴型耳廓复合组织瓣一期修复大块鼻翼缺损[J]. 实用美容整形外科杂志, 1999, 10(2): 71-73.
[6] 李光早, 徐静, 熊竹友, 等. 滑车上血管蒂额部皮瓣转移鼻再造术[J]. 中华医学美学美容杂志, 2009, 15(20): 73-76.
[7] Sanne E M, Linda M, Peter C L, *et al*. Nasal Reconstruction after Malignant Tumor Resection: An Algorithm For Treatment[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2010, 126(1): 97-105.
[8] 钱云良, 章一新, 张余光, 等. 显微移植耳廓组织瓣再造鼻翼[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 2004, 39(1): 676-678.
[9] 蔡晓燕, 黎志明, 许杨滨, 等. 滑车上动脉的解剖特点[J]. 中华整形外科杂志, 2009, 25(6): 456-458.
[10] 王会勇, 李青峰, 顾斌, 等. 滑车上动脉的解剖研究及在鼻再造中的应用[J]. 中华整形外科杂志, 2007, 23(6): 487-490.
[11] Reece E M, Schaverien M, Rohrich R J, *et al*. The paramadian forehead flap: a dynamic anatomical vascular study verifying safety and clinical implication[J]. Plast Reconstr Surg, 2008, 121(6): 1956-1963.
[12] 章宏伟, 姚刚, 闻国华, 等. 改良前额旁正中皮瓣在鼻缺损修复和再造中的临床应用[J]. 中华整形外科杂志, 2010, 26(1): 1-4.

(**收稿**:2012-09-06;**修回**:2012-10-18)
(编辑 王小寒)

“第二届回生口服液与恶性肿瘤/凝血紊乱学术论文征文活动”通知

近年来研究表明,恶性肿瘤和凝血紊乱之间关系密切,甚至互相促进,对患者的治疗和康复造成了很大影响。回生口服液是由成都地奥集团天府药业于1994年推出的治疗恶性肿瘤的复方中药制剂。在临床使用近20年中,抗肿瘤、改善患者生存质量和纠正凝血紊乱等疗效确切,得到了广大医生、患者的认可。成都地奥集团天府药业联合《中国实用内科杂志》、《山东医药》杂志于2011年联合发起“第一届回生口服液与恶性肿瘤/凝血紊乱学术论文征文活动”,取得了圆满成功。为了更好地推动相关研究,成都地奥集团天府药业股份有限公司联合《第三军医大学学报》、《中国实用内科杂志》共同发起“第二届回生口服液与恶性肿瘤/凝血紊乱学术论文征文活动”。

征文内容:①回生口服液对不同肿瘤的疗效观察;②回生口服液与其他治疗(手术、放化疗、内分泌治疗、分子靶向治疗等)联合使用的方法研究和疗效观察;③回生口服液对患者生存质量的作用;④回生口服液在恶性肿瘤病人中预防性抗凝治疗的疗效、对预后的影响(如对治疗后转移复发等);⑤凝血紊乱的近期、远期检测指标,各指标灵敏度、特异度。⑥恶性肿瘤与凝血紊乱/血栓性疾病发生的流行病学研究

要求:①与其他治疗方案联合时,应该说明回生口服液的使用方法、剂量、疗程持续时间,并应该排除其他药物的干扰;②与凝血紊乱相关的研究,检测指标必须包括凝血四项、血小板计数、D-Dimer,有条件者应该纳入蛋白C和蛋白S,其余研究者自选;③临床试验须严格按照临床科研方法设计,要求严谨、真实;④应征论文须未公开发表过。

征文栏目:论著、短篇论著。截稿日期:2013年10月31日。论文投递方式:上杂志社网页实名注册投稿,请在投稿中文题目前注明“(征文)”字样。《第三军医大学学报》网址:http://aammt.tmmu.edu.cn/

奖励办法:①设立一、二、三等奖及优秀奖各1名、2名、3名、10名,分别奖予10 000、5 000、3 000、1 000元奖金,并颁发获奖证书(第一届征文活动一等奖空缺,10 000元奖励累计到本届,即本届一等奖实际奖金20 000元)。②获奖论文将被《第三军医大学学报》、《中国实用内科杂志》择优发表;③每位投稿作者均可获得国家继续教育学分及论文集;④所有投稿文献将汇编为杂志单行本。

《第三军医大学学报》
《中国实用内科杂志》
成都地奥集团天府药业股份有限公司