
stroke: estimates from the Framingham Study[J]. Stroke, 2006, 37(2): 345-350.
[2] Memezawa H, Minamisawa H, Smith M L, *et al*. Ischemic penumbra in a model of reversible middle cerebral artery occlusion in the rat[J]. Exp Brain Res, 1992, 89(1): 67-78.
[3] Longa E Z, Weinstein PR, Carlson S, *et al*. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats[J]. Stroke, 1989, 20(1): 84-91.
[4] Tamura A, Graham D I, McCulloch J, *et al*. Focal cerebral ischaemia in the rat: 1. Description of technique and early neuropathological consequences following middle cerebral artery occlusion[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 1981, 1(1): 53-60.
[5] Yamamoto M, Tamura A, Kirino T, *et al*. Behavioral changes after focal cerebral ischemia by left middle cerebral artery occlusion in rats[J]. Brain Res, 1988, 452(1/2): 323-328.
[6] Harvey J, Rasmussen T. Occlusion of the middle cerebral artery; an experimental study[J]. AMA Arch Neurol Psychiatry, 1951, 66(1): 20-29.
[7] Imai H, Konno K, Nakamura M, *et al*. A new model of focal cerebral ischemia in the miniature pig[J]. J Neurosurg, 2006, 104(2 Suppl): 123-132.
[8] Yamori Y, Horie R, Handa H, *et al*. Pathogenetic similarity of strokes in stroke-prone spontaneously hypertensive rats and humans[J]. Stroke, 1976, 7(1): 46-53.
[9] Durukan A, Tatlisumak T. Acute ischemic stroke: overview of major experimental rodent models, pathophysiology, and therapy of focal cerebral ischemia[J]. Pharmacol Biochem Behav, 2007, 87(1): 179-197.
[10] Bederson J B, Pitts L H, Tsuji M, *et al*. Rat middle cerebral artery occlusion: evaluation of the model and development of a neurologic examination[J]. Stroke, 1986, 17(3): 472-476.
[11] Hisaki H, Okazaki T, Kubota M, *et al*. L-PDMP improves glucosylceramide synthesis and behavior in rats with focal ischemia[J]. Neurol Res, 2008, 30(9): 979-984.
[12] 槐雅萍, 杨永轩, 贾子善, 等. 探索学习对局灶性脑梗死大鼠梗死灶周围皮质巢蛋白及突触素表达的影响[J]. 中国全科医学, 2010, 13(5): 501-505.
[13] Coyle P. Middle cerebral artery occlusion in the young rat[J]. Stroke, 1982, 13(6): 855-859.
[14] 谭县辉, 曲宏达, 彭康, 等. 补阳还五汤对缺血性脑卒后遗症大鼠神经增殖作用的影响[J]. 南方医科大学学报, 2006, 26(2): 189-192.
[15] 马向阳, 贾子善, 槐雅萍, 等. 探索学习对局灶性脑梗死大鼠学习记忆和新生血管的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2008, 23(12): 1086-1088.
[16] 槐雅萍, 杨永轩, 贾子善, 等. 探索学习对局灶性脑梗死大鼠梗死灶周围皮质巢蛋白及神经生长因子表达的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2009, 24(11): 977-980.
[17] 王中琳. 首乌仙海片对缺血性卒中模型大鼠脑组织 GFAP、GAP-43 表达的影响[J]. 北京中医药大学学报, 2009, 32(8): 537-539, 560.
[18] Butcher S P, Bullock R, Graham D I, *et al*. Correlation between amino acid release and neuropathologic outcome in rat brain following middle cerebral artery occlusion[J]. Stroke, 1990, 21(12): 1727-1733.
[19] Chen S T, Hsu C Y, Hogan E L, *et al*. A model of focal ischemic stroke in the rat: reproducible extensive cortical infarction[J]. Stroke, 1986, 17(4): 738-743.
[20] 朱美玲, 彭爱军, 那晓东, 等. 脐血有核细胞移植治疗脑卒中的动物实验[J]. 中国组织工程研究与临床康复, 2007, 11(33): 6629-6632.
[21] 贾子善, 李阔, 槐雅萍, 等. 不同环境干预对局灶性脑梗死大鼠行为学恢复的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2007, 22(7): 578-580.
[22] Coyle P, Jokelainen P T. Dorsal cerebral arterial collaterals of the rat[J]. Anat Rec, 1982, 203(3): 397-404.
[23] 张成英, 陈前芬, 田鹤村. 用大鼠制作脑缺血模型血管阻断部位的选择[J]. 四川解剖学杂志, 2002, 10(1): 12-16.
[24] 张成英, 陈传好, 邵正仁, 等. 大鼠颈内动脉的解剖及其在脑缺血模型中的应用[J]. 解剖学杂志, 2002, 25(6): 581-583.

(**收稿**:2011-02-23;**修回**:2011-05-25)
(编辑 栾 嘉)

欢迎订购《疑难先天性心脏病介入治疗与图解》



由宋治远、朱鲜阳、秦永文、张玉顺等教授主编的《疑难先天性心脏病介入治疗与图解》已于2011年1月由军事医学科学出版社正式出版。该书编者均为国内一流先天性心脏病介入治疗专家,具有丰富的临床经验,总结了临床常见及少见的疑难先天性心脏病介入治疗方法。全书共10章,收集了各种疑难先天性心脏病180例患者的800余幅影像资料,系统介绍了室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭、主动脉缩窄以及复合畸形等复杂先天性心脏病介入治疗操作技巧与经验教训。本书贴近临床、图文并茂、形象具体、通俗易懂,既有临床操作技巧,又有经验教训分享,是一本难得的具有先进水平的临床参考书,相信会成为广大先天性心脏病介入治疗医师的良师益友。

本书定价198.00元,如需购买请与本刊编辑部联系。

联系人:王 红 **电话**:(023)68752189-84

E-mail:whong@mail.tmmu.com.cn