
?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

1 吴展元,林尚泽,王正强,等主编.耳鼻咽喉科学.贵阳:贵州科学技术出版社,1992:205～208

2 Weber AL, Stanton AC. Malignant tumor of the paranasal sinuses: radiologic, clinical and histopathologic evaluation of 200 cases. Head and Neck,1984,6:761

3 Miyaguchi M, Sakai S. Spontaneous pain in patients with maxillary sinus carcinoma in relation to T－classification and direction of tumour spread. J Laryngology and Otology, 1992,106:804～806

4 沈复兴,任孝萱.上颌窦恶性肿瘤的CT诊断.中华放射学杂志,1990,24(4):224

5 谷田次郎(赵金林,钟一江,译).上颌窦癌骨破坏的X线分析.国外医学:临床放射学分册,1993,5:293

(收稿:1994-02-19;修回:1994-10-04)

老年妇科肿瘤手术治疗分析

Analysis of surgical treatment for aged women with gynecological tumors

程显杰 杜保琳 (第三军医大学新桥医院妇产科) 630037

随着国民经济的发展和人民生活条件的改善,人民的平均寿命逐渐提高,老年人口不断增加,使年龄结构发生了变化,关于老年人的医疗保健问题受到人们重视;因此对老年人疾病的治疗、护理工作提出了更高要求[3],本文就老年人妇科肿瘤的手术治疗问题进行回顾分析。

1 临床资料

1976年1月至1992年12月共收治60岁以上老年妇科病患者71例,其中42例施手术治疗,并对42例老年妇科手术治疗及疗效和注意事项及并发症等进行分析讨论。

1.1 年龄

最大84岁,最小60岁,平均年龄64.9岁。

1.2 42例术前诊断(见表1)

表1 42例术前诊断

术前诊断	例数	%
卵巢肿瘤	23	54.7
子宫内膜癌	8	19.0
子宫肌瘤	4	9.5
宫颈癌	2	4.7
左前庭大腺囊肿并感染	3	7.0
卵巢囊肿蒂扭转	2	4.7
总 计	42	100.0

1.3 手术方式及时间(见表2)

表2 手术方式

术 式	例数	%
全子宫及双附件切除术	18	42.8
宫颈癌根治术	1	2.3
附件切除术	11	26.0
阴道内肿瘤切除术	2	4.7
前庭大腺囊肿切开引流术	3	7.0
剖腹探查术	7	17.2
总 计	42	100.0

手术时间最长者210 min,最短者20 min,平均125 min。

2 麻醉

除3例前庭大腺囊肿切开引流采用局部麻醉外,其余39例手术均采用持续硬膜外麻醉,麻醉效果好,无一例并发症,成功率100%。

3 术前病人身体状况

手术前合并有高血压者11例(26.1%),血压最高者27/14 kPa,在高血压病人中,1例高血压伴有左心室肥大,心肌轻度劳损。另一例高血压伴有窦性心动过速房室传导阻滞。高血压并有糖尿病者2例,血糖最高8～9 mmol/L。4例并有慢性支气管炎及肺气肿。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net