DOI:10.16016/j.1000-5404.1992.03.002

骨生成。

关键词 白血病，淋巴母细胞性；骨髓纤维化；骨质溶解；麦角骨化醇

参考文献

1. Stein A, Boughton BJ. Common acute lymphoblastic leukaemia in an adult with hypercalcaemia and lytic bone lesions. Br J Haematol 1988;70:503
2. Catovsky D, Greaves MF, Rose M, et al. Adult T-cell lymphoma-leukaemia in blacks from the west Indies. Lancet 1982;1:639～643
3. 迂浩一郎 石黑 精 花岗康彦，等。儿童急性幼稚淋巴细胞白血病合并骨质疏松和背椎压缩性骨折二例。临床血液 1986;27(2):263～268
4. Castro-Malaspina M, Rabellino EM, Yen A, et al. Human megakaryocyte stimulation of proliferation of bone marrow fibroblast. Blood 1981;57:781～787
5. McCarthy DM, Hibbin JA, Goldman JM, et al. A role for 1, 25-dihydroxyvitamin D_3 in control of bone marrow collagen deposition? Lancet 1984;1:78～80

（收稿：1991-07-23；修回：1992-01-16）

胆管囊肿空肠 Roux-en-y 吻合术后并发旷置空肠袢多发性息肉一例

孙文兵 李智华 李云山* 马宽生 蔡景修 （第三军医大学西南医院肝胆外科中心）630038

女性患者，12 岁，间歇性上腹疼痛 10 年，胆管囊肿空肠 Roux-en-y 吻合术后 8 年。出生后其母发现患儿剑下明显膨隆，从 2 岁起常诉上腹疼痛，4 岁时在当地剖腹探查，行胆管囊肿空肠 Roux-en-y 吻合术。我院查体见右上腹一纵形疤痕，无其它阳性体征。B 超及 ERCP 均提示先天性胆总管囊肿（Ⅰ型），其余检查正常。术中见胆总管囊肿约 8cm×6cm×6cm 大小，原旷置空肠袢约 60cm。其内壁有无数个息肉样增生，最大一个位于囊肿空肠吻合口下方，约 3cm×2cm×2cm 大小，其余从黄豆大至米粒大小不等，分布由囊肿近端至远端逐渐变小变稀。切除囊肿及息肉段空肠 20cm。未切除部分与仍有病变，后行胆肠吻合，术后恢复顺利。病理报告为切除段空肠多发性炎性息肉伴淋巴组织增生。

讨论

胆管空肠 Roux-en-y 吻合术后，旷置的空肠段因无胃肠内容物通过，常引起一系列病理效应，如细菌繁殖过盛导致胆汁酸盐浓度降低，脂肪消化障碍，高胃酸分泌导致十二指肠溃疡等[1,2]。旷置空肠袢并发多发性息肉实属罕见，本例空肠袢息肉呈自囊肿近端至远端逐渐变小变稀的特点，提示息肉的发生和发展与空肠袢内环境的改变有关，具体机制尚需进一步探讨，息肉的转归亦有待进一步观察

参考文献

1. 王敖川。胆肠吻合术后并发症。解放军医学杂志 1986;11:325
2. 黄志强 。腹部外科基础。北京，人民卫生出版社 1988:277

（收稿：1991-12-25；修回：1992-04-24）

* 兰州市第一人民医院肝胆外科

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net