DOI:10.16016/j.1000-5404.1990.06.021




图1 冰冻切片革兰氏染色显示的真菌和G⁺球菌。10×100




图2 与图1同一标本冰冻切片PAS染色显示的真菌。10×40

程只需30min，简便易行，具有可靠、灵敏的优点。因此，不失为1种能够为烧伤病人创面感染提供快速早期诊断的有效方法。

本文结果同时提示，随着烧伤创面细菌菌量的增加，混合性真菌感染的发病率也呈进行性的增加，细菌与真菌“共存”及“同步增长”的感染现象，应引起关注。

参 考 文 献

1. 肖光夏，等。烧伤病人组织细菌定量培养的临床意义。解放军医学杂志 1981；6（3）：139
2. JOHN C, et al. A Gram Stain for Smears of Blood Cultures, Body Fluids and Tissues. Am J of Med Technology 1976;42 (11) :417～423
3. 刘介眉，等。病理组织染色的理论方法和应用。人民卫生出版社，1983:302

（收稿：1990.02.13；修回：1990.07.09）

某集团军指战员吸烟状况调查

薛国文（流行病学教研室）
李维民*（56005部队卫生处）

吸烟的危害已被公认，它与早衰、疾病和死亡关系密切，是当前预防医学最受关注的课题之一。为了解我军吸烟状况，我们选择了2个师共116个连队，采用整群抽样方法对8000名指战员进行调查。被调查者每人填写1份调查表。实际收回7620张调查表，经审察去掉129张，实际统计7491张，失访效6.36%。抽取5%复查，即375人，填表相符者350人，一致率为93.33%。调查对象均为男性，战士17岁～24岁，干部24岁～40岁。

调查结果，7491人中现吸烟4548人，占60.70%，偶吸烟1372人，占18.32%，两者共5920人，总吸烟率79.03%。不吸烟者1277人，占17.05%，曾吸烟现已戒烟者294人，占3.92%。

排以上干部619人，吸烟者525人，占84.81%，不吸烟者94人占15.19%。战士6872人，吸烟者5395人，占78.51%，不吸烟1477人，占21.49%。经统计学处理干部、战士吸烟率有显著差异（$X^2=13.25$，$P<0.1$）。

开始吸烟年龄最早6岁，最晚34岁，其中16岁～20岁开始吸烟者占66.53%。入伍前吸烟者2222名占吸烟总数的35.75%，入伍后吸烟者3992人，占64.24%。吸烟年数，半年至3年者占51.25%。每日吸烟10支以下占43%，11支～20支占42%，21支以上占15%。

* 现调三医大卫生勤务教研室

（下转534页）

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

认识不足。我们认为，除征象典型者外，对边缘模糊，又具特征形态的应加重视，有助于提高认识，结合临床可作出明确诊断。

参 考 文 献

1. 高鹤舫。中耳炎胆脂瘤100例临床及X线分析。中华放射学杂志 1980；14:303～305
2. 叶 瑛。耳科疾病X线诊断的概要。放射学情报通讯 1986；2:31～34
3. 邓杏村。乳突胆脂瘤X线诊断。中华医学会放射学术会议论文摘要 1963:211
4. 甄道济。乳突胆脂瘤的X线诊断。白求恩医科大学学报 1979；3:71～76
5. 张益瑛。乳突胆脂瘤附100例报告。中华放射学杂志 1954；3:210～219
6. 上海第一医学院主编。X线诊断学。上海科技出版社 1978:924～932

（收稿：1989.08.30；修回：1989.11.22）

（上接525页）

吸烟心理因素，成瘾者1105人（21.80%）、习惯704人（13.89%）、交际711人（14.23%）、情趣762人（15.04%）、兴奋465人（9.18%）、镇静797人（15.73%）、享受523人（10.32%）。每班吸烟者有5名以上的班数占49.32%，在这些班中即使不吸烟也同样受被动吸烟之害，而且比主动吸烟危害更大。

因吸烟引起的咳嗽痰多者1527人（25.79%）、胸部不适842人（14.22%）、头昏633人（10.69%），而不吸烟者上述症状很少或无。经驻军医院诊断的疾病，在吸烟者中，支气炎111例，不烟吸者8例。

在吸烟者中有83.75%的人，认为吸烟有害，有11.47%认为吸烟无害，有70%的人不想戒烟。

从以上结果来看，此集团军吸烟率79.03%，比太原市居民[1]、上海市军民[2][3]吸烟率均高（50%～70%、45.6%）。这是否与西南当地群众吸烟率高有关，尚不能肯定。该部队对吸烟危害认识不清，应大力宣传吸烟对健康的危害。WHO报道[4]，吸烟的青少年咳嗽、肺部感染及肺功能受损的，明显多于不吸烟者。如能及早戒烟，症状可以好转，相反，吸烟成瘾直到成年，就会导致慢性支气管炎甚至肺癌，还可导致冠心病、心肌梗塞，严重影响健康，缩短寿命。也有文献报道吸烟即是吸毒。1支香烟中至少有29种毒物，其中尼古丁是剧毒物，只要1滴在舌头上，几分钟就可将人毒死。如果每天吸20支烟，每支吸10口，就吸了200次29种毒物，这是慢性中毒过程。

本次调查表明，初次吸烟多是好奇或别人怂恿，所以只要加强教育和自我控制可以不染上或戒掉吸烟习惯。部队也可规定在会场、电影院等公共场所不准吸烟，还可创建“不吸烟班”、“不吸烟宿舍”等。不把香烟当作“招待品或”“慰问品”，尽量减少吸烟对大家健康的危害。

参 考 文 献

1. 韩小友，等。太原市居民吸烟率调查。中华预防医学杂志 1987；21(4):246
2. 邓 杰。等。上海市区11万成年居民吸烟状况调查分析。中华预防医学杂志 1985；19(5):271
3. 倪仁宝，等。驻沪1455名指战员吸烟状况调查分析。解放军预防医学杂志 1988；6(4):67
4. 叶恭绍。青少年吸烟难道不严重吗？中华预防医学杂志 1983；17(3):159

（收稿：1989.07.14 修回：1989.10.25）

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net