DOI:10.16016/j.1000-5404.1986.s1.035

消减后病人的抽搐、癫痫、眼部损害、骨损害和出牙异常等表现易导致忽视是本病的并发症或误诊为它病，应加以注意。

有人把本病的临床演变过程分为三期：1.大疱水疱期：出生后不久出现。2.肥厚期：有浸润、角化过度、疣状或乳头瘤样损害。3.色沉着期：有不规则分布的灰褐色奇异斑点。此三期发生发展的次序并非固定，可重叠或隔期，有时病人身上同时可见三期皮损。

另有人将本病分为两型：即Sulzberger-Bloch型和 Naegli 型，前者多为女性，呈泼水样色素沉着，无畸形。后者男女均可发生，网状色素沉着和各种畸形。报告的6例中属前者的2例，后者4例，本例属后者。

目前对本病的治疗无有效办法。预后主要取决于中、外胚层发育不全的程度和部位。Sulzberger-Bloch型比 Naegei 型预后好。在命名上前者以色素失禁病而后者以色素失禁综合症较能体现发病性别及预后。（本文承本科刘荣卿主任审阅，谨致谢意）

参 考 文 献

1. 朱德生，等。中华皮肤科杂志 1956；2：125
2. 麻致中。中华皮肤科杂志 1958；4：327
3. 蒋以楷。中华皮肤科杂志 1958；6：519
4. 买鸿业，等。中华皮肤科杂志 1965；3：171
5. 于英川。临床皮肤科杂志 1982；2：104
6. Jessen RT, et al.Arch Dermatol 1978：114(8):1182
7. 武汉医学院第一附属医院主译。临床皮肤病学 1980：228

曲别针取鼻腔异物48例

房正国（第二附属医院 耳鼻咽喉科）

鼻腔异物多见儿童，一般多由玩耍将异物塞入鼻腔。笔者从1975年10月～1986年12月使用曲别针取出鼻腔小钢珠、黄豆、蚕豆、橡皮、纸团等异物共48例，无一例并发症，效果满意，报告如下。

一、用具和方法

曲别针一枚。用手将其伸展，持右手母指和食指拿曲别针一端，将掴起端由鼻孔前上且与鼻背平行插入异物上端向外，向下撬动，即取出异物。

二、优 点

此法简便易行。手法快、效果好、无痛苦，可避免其他一切方法的合并症和不良后果。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net