
DOI:10.16016/j.1000-5404.1986.s1.040

甲状腺结石伴骨化一例报告

赵先柱 陈昌荣（第三附属医院 普外科）

患者女性，56岁。无意中发现右侧颈部包块一年二个月于1985年5月17日入院。发现包块前无颈部疼痛、红肿或畏寒、发热等病史；发现包块后亦无任何局部症状。包块生长缓慢。入院前6个月自觉性情改变，急躁易怒，夜间潮热出汗，食欲下降。入院检查：体温、脉搏、呼吸、血压正常。发育正常，营养欠佳。右侧颈前区局限性隆起．气管居中，右侧甲状腺下极可触及4×4cm大小包块，质硬、边界清楚，表面光滑，无压痛；左侧甲状腺下极也可触及2×1.8cm大小包块，质坚硬，圆形、边界清楚，光滑、无压痛。两侧之包块均随吞咽上下活动。胸腹及四肢无异常。血常规正常。血清$T_3$80mg%，$T_4$10mg%。甲状腺吸碘^{131}I率功能增高。X线检查：颈部透视气管左缘相当于左侧甲状腺下极有1.8cm大小致密钙化影，其部位与左甲状腺包块一致。胸部正常。初步诊断为左侧甲状腺癌；右侧甲状腺瘤囊变。在局麻下行两侧甲状腺包块切除术。右侧包块术中送病理冰冻切片检查诊断为甲状腺瘤囊性变。左甲状腺包块包裹于正常腺组织之中，包膜与正常腺组织界线清楚但粘连甚紧，质坚如石。包块1.9×1.6cm（附图）。脱钙后病理



检查：类圆形组织一块，包膜完整，半囊半实，切开见有少量淡黄色液体流出。囊腔占1/3，2/3为实性。切面淡红间灰白色。镜检：包块表面附有一层纤维膜，纤维膜上附有甲状腺滤泡。滤泡较少，其内充满胶质。包膜内为增生的纤维组织并有钙盐沉积，部分区域可见骨样组织化生，并见较多大小不等呈筛状结构的囊腔。病理诊断：左侧甲状腺结石伴骨化。术后十天痊愈出院。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net