DOI:10.16016/j.1000-5404.1987.04.033

重庆部分地区3850例干部健康检查消化系统疾病发病情况

文国义 于世远 胡扬腾 胡淑碧 丁 玉 (第二附属医院 消化内科)

我院自1983年3月～1985年5月对重庆地区某些厂矿、学校、企、事业单位高、中级知识份子和中层领导干部共3850名，进行了短期住院健康检查。检查项目除一般病史、体查、常规化验检查外，各科还进行了有关特殊检查。消化系统除AFP、HBsAg、肝功能、酶谱、血脂、B超列为普查项目外，还根据病史进行了胃肠道X线检查及纤维胃镜检查。现将检查结果分析于后。

一、性别及年龄分布的情况

3850例中40～59岁3227例，占总数83.81%，其中男性2861例，女性366例。

二、主要疾病的检出率

表1

病名	例数	%
食道憩室	2	0.05
慢性浅表性胃炎	381	9.89
慢性萎缩性胃炎	81	2.10
胃下垂	44	1.14
胃粘膜脱垂	34	0.88
胃溃疡	9(4例为钡餐诊断)	0.23
幽门管溃疡	3	0.07
胃癌	2	0.05
残胃吻合口炎	16	0.41
吻合口溃疡	1	0.02
慢性十二指肠球炎	375	9.74
十二指肠球部溃疡	170(162例为钡餐，8例为胃镜诊断)	4.41
十二指肠憩室	11	0.28
空肠憩室	2	0.05
过敏性结肠炎	68	1.76
慢性结肠炎	7	0.18
肝囊肿	36	0.93
脂肪肝	10(伴血脂增高7例)	0.25
肝硬化(失代偿期)	6	0.15
多囊肝	6	0.15
肝癌	4	0.10
HBsAg阳性者	165(无肝炎病史者125例)	4.28
慢性胆囊炎	13	0.33
胆石症	158(伴血脂增高者64例)	4.10

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n

三、494例纤维胃镜检查结果

表2

病　名	例数	%
慢性浅表性胃炎	381	77.12
慢性十二指肠球炎	375	75.91
慢性萎缩性胃炎	81	16.39
残胃吻合口炎	14	2.83
十二指肠球部溃疡	8	1.61
胃　溃　疡	5	1.01
幽门管溃疡	3	0.60
胃　癌	2	0.40

胃镜检查时胃炎与球炎常同时存在，因此例数有重叠。

讨　论

3850例干部体检中常见疾病的发病率以慢性浅表性胃炎最多，其次为慢性十二指肠球炎、十二指肠球部溃疡、乙肝表面抗原阳性者、胆石症、慢性萎缩性胃炎、过敏性结肠炎等。全部受检人员中有胃病史1161例，占总数1/3强。乙肝表面抗原阳性165例，仅1/4有肝炎病史，肝功能全部正常，可能为隐匿性感染，但更大可能为健康携带者，对社会威胁大，值得重视。

158例胆石症中，绝大部分为胆囊结石，仅20例有胆结石病史，其余138例本次体检才被发现，伴有血脂增高者64例占40.5%。

本文AFP不同程度增高8例，临床均无任何症状，4例经手术确诊为肝癌，一例术后一年死亡，另3例术后已3年至今仍存活，其余4例失去联系。

胃癌检出2例均属中晚期，一例病史一年余，病灶位于胃底后壁，贲门部亦有浸润，未能手术切除。另一例病史2月余，为胃窦部腺癌Ⅰ—Ⅱ级，约$4\times4\times3cm^3$，病变深达肌层，周围粘膜上皮呈重度化生萎缩性改变，肠系膜淋巴结有转移，作胃大部根治切除胃空肠吻合术，术后化疗一疗程，现已一年余一般情况尚好。

十二指肠球部溃疡的发病率本文明显高于胃溃疡，约18:1，可能系球部间接X线征象难与十二指肠球炎区别之故。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n