DOI:10.16016/j.1000-5404.1987.04.035



# 人体美丽筒线虫病一例

邹菊贤 余明芳 赵子鹏*（第二附属医院 检验科）

美丽筒线虫（Gongylonema pulchrum Molin, 1857），寄生于人体的病例，1955年冯兰洲等[2]首先在国内报道，但自1978年以来，甚为罕见。我们曾在本院门诊发现一例，现报告如下。

患者周××，女性、35岁，已婚，农民，重庆潼南县人，从小务农于15岁结婚，一直居住原籍。患者自述1986年5月，因食道到咽喉部有刺激性发痒、虫爬感。吃花椒、辣椒后，即呕吐出“小白虫”，虫动时有一寸半左右长，缩小时如小米粒状大小。在当地医院就诊，未能确诊。86年11月初又感不适，除有上述症状外并伴有唾液增多，食量减少、恶心、咳嗽、胸部不适。患者于86年11月17日呕吐出“小白虫”，当即用麦杆挑出30余条装入干净瓶内，当即送当地医院就诊，仍未能确诊，逐来我院就诊。

五官、口腔科检查：除软腭、硬腭、扁桃腺、咽喉部有轻度红肿外，其他未发现异常。

化验检查：血红蛋白10.7 g/dl，红血球373万/μl，白血球10,000/μl，中性粒细胞62%，单核细胞2%，淋巴细胞23%，嗜酸性粒细胞13%。末梢血嗜酸性细胞计数1432/mm³。大便及唾液检查未见虫卵。

虫体经我们检查为细长、乳白色长腺形，镜下略呈黄色，死体最长为13.84mm，最短为5.6mm，直径约0.2～0.26mm。活体虫镜检发现虫体头段有明显的纵行排列并有许多大小不等，形状各异、数目不同的花缘状表皮突，排列成纵行，口小象漏斗形，由于虫体未经透明处理，故看不见唇办及虫卵生殖等微细结构。据以上情况，我们确定为美丽筒线虫。

此虫寄生于人体的口腔舌下、牙龈、上唇、下唇、软腭、硬腭、扁桃腺和食道的粘膜下组织[1]。国内从1955年冯兰洲等[2]开始到1978年刘织云等[3]先后在河南、山东、天津等地发现报告外，在近七、八年内未见报道。国外也有报道，但在四川重庆还未发现有此病例报告。

**参 考 文 献（略）**

*：三医大寄生虫学教研室教授

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n