DOI:10.16016/j.1000-5404.1985.04.026

磁疗对耳廓假性囊肿疗效观察

房正国 周素珍 何翠琴 朱以钊

（第二附属医院 耳鼻喉科）

以往我科对耳廓假性囊肿治疗，一般采用抽液和加压包扎，局部注射强的松龙，理疗等方法，收到一定疗效。但加压包扎不易加压患处，需反复抽液，增加了病人的痛苦。我科于1978～1984年对耳廓假性囊肿进行了87例磁疗，资料完整者69例，效果满意，报告如下。

一般统计

69例中，男65例，女4例。年龄最小8岁，最大61岁。20岁以上占81%，病程最短2天，最长45天，局限性肿胀57例，较广泛性12例。

材料与方法

我科对耳廓假性囊肿治疗多采用动磁疗法。动磁机极型为同名极（N和S）或异名极，磁片体积大号1.2×0.4cm，小号0.8×0.2cm，数量两片，用一层纱布或薄棉花裹着磁片，异名极（N和S）对置于消毒的病变部位贴敷，以胶布固定之。表面磁强为800高斯，一周为一疗程。对少数病程较长者，10天为一疗程。

疗效评定

1. 痊愈 在一疗程以内积液消失，无压痛，耳廓恢复正常。

2. 显效 积液在10天内消失，耳廓无压痛畸形，但局部有纤维组织增生。

3. 好转 经过2～3个疗程积液大部吸收，患处有轻度压痛。

4. 无效 治疗三个疗程以上积液仍不消失。

效果统计表

疗效	痊愈	显效	好转	无效	合计
例数	60	6	2	1	69
%	86.95	8.70	2.90	1.45	100%

病历介绍

1. 邓××，女，18岁。右耳廓肿胀20余天，当地医院多次打针吃药未消，诊断：右耳廓假性囊肿。检查：右耳甲腔蚕豆大隆起，有波动感，无红肿触痛。用800高斯动磁片异名极2片患处贴敷，一周取磁，积液完全消失。

2. 肖××，男，48岁，厂医。右耳廓上方隆起4天。检查：右耳廓三角窝1.2×0.6cm局限性隆起，有波动感，皮肤无红肿。用800高斯动磁异名极2片贴敷患处，7天取磁，积液完全消失。

体会

磁疗治疗耳廓假性囊肿，具有良好的镇痛、消炎、消肿、止痒等作用。效果肯定，方法简便易行，经济实用，副作用少，十分安全。它避免了反复抽液、包扎等缺点，此法值得推广应用。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net