DOI:10.16016/j.1000-5404.1985.01.017

川芎治疗扁平疣64例的疗效观察

李文维　徐鸿声　叶庆俏　顾正兰

（第三附属医院　皮肤科）

我科自1975年以来使用川芎注射液治疗扁平疣，现将资料完整的64例总结于下：

一、一般资料：男31例，女33例。年龄最小6岁，最大36岁，15—25岁46例。病程半年以内21例；半年—两年19例；2—4年20例；4—10年4例。多数患者无自觉症状，15例有微痒感。48例曾采用其它治疗方法无效。

二、治疗方法：使用我院药厂制成的10%川芎注射液，成人每次4 ml，12岁以下儿童每次2ml，肌肉注射，每日一次。10次为一疗程，未出现效果重复1—2个疗程。女性于月经期间停用。月经过多，出血性疾病，阴虚火旺者禁用。

三、疗效观察：1、疗效标准：①痊愈：损害完全消退或遗留一时性色素斑点；②显效：损害消退60%以上；③进步：损害部分消退；④无效：损害未见改变者。2、治疗结果：痊愈23例（35.9%），显效19例（29.6%），进步10例（15.6%），无效12例(18.7%)。其中1例注射3次皮疹消退，另1例注射53次皮疹消退。3、付作用：①多数患者有注射部位疼痛感，疼痛持续时间比注射板兰根长。②两例女性患者用药后经期提前4—5天，停药后恢复正常周期。

四、讨论：1、据《诸病源候论、疣目候》和《医宗金鉴、牛程蹼》的论述，疣类的病因为忧郁伤肝，肝郁气滞和气滞血凝而致血瘀。在此理论的基础上，我们采用活血化瘀法治疗扁平疣，应用加味桃红四物汤和川芎皆取得一定疗效。2、川芎为血中气药，能升能散，上升头目，旁达四肢，下行血海，辛散走串，有行气化瘀之功用。据临床及实验室资料表明，注射川芎后，血流速度增快，血管扩张，对聚集的白细胞有明显解聚作用，能改善微循环障碍。我们也观察到有的患者用药后全身有热乎乎感觉或患处灼热、发痒、发红的作用。推断为川芎改变了机体内在环境，造成不适合病毒生存的条件，从而达到治愈扁平疣的目的。3、上一医华山医院用活血清热散风的治则，治疗扁平疣66例，治愈率53%，总有效率81.9%；我校一院用红花治疗36例治愈率91.6%；我科用加味桃红四物汤治疗21例，治愈率38.1%，总有效率52.4%，与前两单位相比其有效率略低。我们体会到加味桃红四物汤和川芎，对它法治疗无效的扁平疣是行之有效的治疗方法之一。4、有作者提出川芎用量宜小，口服一日量不超过30g，剂量过大引起呕吐眩晕，本组病例未发现此类付作用。注射部位疼痛多为川芎嗪生物碱刺激所致。使用川芎注射液治疗扁平疣的优点是安全，无明显付作用，不需要作复杂的辨证，药源丰富，使用方便。

参考文献（略）

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net