DOI:10.16016/j.1000-5404.1979.04.014




图2　术后胸片及静脉肾盂造影

眼球结膜裂头蚴病(Sparganosis)一例报告

赵子鹏* 邝建伯** 吴继云** 董丽娟*

患者袁××，男，40岁。已婚，四川达县堡子区米城公社社员。于1978年9月29日来达县地区人民医院门诊五官科就诊。自述："五月前右面部浮肿，无红痛，土霉素治疗后浮肿消退。半月前秋收煞夜后，右眼角有黄豆大小包块，无红痛；两天后，受凉，右眼红肿，青链霉素治疗，红肿消退，发现右'白仁'处有包块"。经检查视力为0.8，发现右球结膜外上方有一包块（1.5×2cm），略呈黄色，可活动，余正常。手术切开球结膜后从肿物内拿出一条活动白色条带状寄生虫，固定于乳酸酚后长75mm，固定前长200mm。术后一个半月复查：右眼视

* 第三军医大学寄生虫学教研室
** 四川省达县地区人民医院五官科

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

力为1.5，原伤口处平复，仅球结膜下组织轻度瘢痕，全身无不适。患者一直在家务农，从未离开过本地区，否认过去生食及外敷草药蛙肉等，又否认生食蛇肉及其他肉类，亦否认饮入含有剑水蚤的生水等。

裂头蚴之形态

一、大体标本：标本固定于乳酸酚内，呈淡乳黄色，大小75×3—4 mm，虫体为一圆柱状实体幼虫，不分支，体表呈现皱纹，看起来好似分节（图一、图二）；体表一侧面之正中附近有一条纵行“体表浅凹陷”（图二）；体之一端呈现明显的头端凹陷（图三），此头端凹陷并不与“体表浅凹陷”相通。

二、石腊切片（H·E染色）：通过纵横二切片可辨别下列结构（图四、图五）：

（一）表皮层：由外向内可见下列层次：

第一层——为不着色的无细胞均匀表面结构，底部可见一细条“基底膜”。

第二层——细胞层，此处细胞聚集较密，但排列零乱；细胞质较少，核大、圆形。此层与“基底膜”之间可见到少量环行肌纤维。细胞与细胞之间尚可见到少量纵行纤维。

（二）表皮层之内侧主要为纵行肌纤维以及少量的环行纤维和斜行肌纤维，又有散在的细胞（圆形或椭圆形，核大，胞质少）及石灰质小体等。


讨　　论

由于未进行动物感染，故裂头蚴的种类不能确定。根据国内外文献记载，裂头蚴感染途径有外敷青蛙肉、生食青蛙肉或其他肉类（鸡、猪、蛇……），或吞饮含有“原尾蚴”的剑水蚤的生水，实验证明“原尾蚴”有直接经皮肤而感染的可能性。本文患者的感染途径可以排除外敷青蛙肉、生食肉类等的可能性，但是患者一直是务农，在农村不自觉地接触到有“原尾蚴”的剑水蚤是有可能的。又根据文献记载，裂头蚴在人体内可至少活到30余年，亦有吞食活蝌蚪5年后才出现眼裂头蚴病的报告，因此，应引起临床上的注意。


小　　结

本文报告一例眼结膜裂头蚴病，其感染途径可排除常见的外敷或生食青蛙肉，但真正的感染途径尚不甚清楚；并对裂头蚴大体及石腊切片标本的形态作了简单描述。


引用文献（省略）




?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图二　裂头蚴（示体表皱纹及纵行体表浅凹陷）　（×23）




图三　裂头蚴（示头端凹陷）　（×23）



图四　裂头蚴（横切面，H.E染色）　（×440）

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



图五　裂头蚴（纵切面，H.E 染色）　　（×440）

双大隐静脉一例报告

第二附属医院普通外科　孙肃朋

训练部手术局解教研室　陈维佩

双大隐静脉又称双隐静脉，是一种罕见的解剖异常，若手术中疏忽易导致大隐静脉曲张复发，所以应引起临床的重视，现将手术中见到的一例，报告如下：

一、病例摘要

患者刘××，男性，62岁，住院号18507。因左下肢静脉曲张十八年于1978年9月9日入本校附二院。

检查：左下肢自卵园窝至小腿前内侧可见多处静脉纡曲隆起。屈氏(Trendelenburg)试验大隐静脉瓣及深浅静脉交通支静脉瓣机能均显示不全，以大隐静脉瓣机能不全为主。深静脉阻塞试验(Perthes试验)显示深静脉通畅，余未发现异常。

手术经过与所见：患者持续硬膜外麻醉，于左腹股沟韧带下作一平行于大隐静脉之切口长约7厘米，找出大隐静脉主干，见大隐静脉干直径0.8厘米，先分离出股外侧浅静脉，结扎切断，再向上分离一支来自髂部的旋髂浅静脉；和一支来自下腹壁的腹壁浅静脉，均结扎切断。由于感到大隐静脉属支数目不够，并且怀疑各属支是否有共干注入大隐静脉之可能，即将分离出的大隐静脉主干在距注入股静脉1厘米处切断并结扎其近端，遂将大隐静脉剥离器插入远端大隐静脉腔内，因在膝关节内侧有大隐静脉瓣膜阻碍，致使剥离器不能通过，故改从大隐静脉下端插入剥离器，当切开左足内踝前上方的皮肤时，发现皮下并列两条等粗之静脉，均紧贴皮下，相距约0.5厘米，直径各约0.4厘米，证实均为浅静脉后，切断两条静脉，

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net