DOI:10.16016/j.1000-5404.1979.04.026

纯水解蛋白或高渗葡萄糖的病菌繁殖要高的多。

3。对插管入口处皮肤的消毒、保护是很重要的。

例 45894 陈××　女　25岁，烧伤92%（86/Ⅲ），由于面积大、Ⅲ度多，而静脉穿刺点靠近创面，且穿刺过程中不太顺利，局部形成小血肿。又由于创面渗液经常污染穿刺点敷料，俯卧时大小便及冲洗会阴时局部敷料有时又被污染而未能及时更换，致局部发生感染，形成小脓肿。

所以在作股静脉穿刺或大隐静脉切开插管后，要特别注意大小便及会阴护理。

如能严格遵守无菌操作，虽然插管时间较长，也能避免感染。

如例29676，王××，女，36岁，烧伤85%(60/Ⅲ)，此病人不但面积大，且有严重呼吸道烧伤，作了气管切开，伤后三天又发生心跳、呼吸停止。一直以人工呼吸器辅助呼吸，右锁骨上锁骨下静脉穿刺插管持续30天之久，其间输了大量血浆、全血、药物。由于输液装置定期更换，穿刺点每日涂擦酒精，撒合霉素，穿刺点附近皮肤经常以酒精擦洗，穿刺点纱布经常保持干燥，气管切开垫经常保持清洁，避免了痰液污染穿刺点敷料，防止了感染的发生。静脉高价营养持续30天后，管端培养阴性。

五、高价营养插管包

为了便于穿刺插管或切开置管，我们设计了高价营养插管包，平时以高压灭菌备用。插管包是用一塘瓷或铝制方盒，内装器械为：

插管空针（扁桃腺注射器改装）	一付
插管穿刺针	二个
10毫升空针（局麻及试穿用）	一付
12号腰穿长针头（锁骨下试穿用）	一个
硅胶管（40厘米长）	二根
圆针头	二个
消毒碗（容量约200毫升）	一个
手术刀	一把
剪刀	一把
蚊式钳	二把
长组织镊	一个
持针器、缝线、三角针	一套
洞巾	一块

消息报道　抗疟新药——硝喹及复方硝喹鉴定会在我校召开

1979年10月5—8日，全国疟疾防治研究领导小组在重庆市第三军医大学召开了抗疟新药硝喹及复方硝喹鉴定会，出席会议的有来自北京、上海计全国12个省市55个单位的代表共70名，有关领导单位也派代表参加了会议。会议听取了关于硝喹的合成工艺、抗疟作用、药理、临床及现场防治等工作的专题报告。代表们进行了认真深入的论讨。会议认为复方硝喹片可以治疗恶性疟、根治间日疟、预防恶性疟和间日疟，特别是能阻断孢子增殖，具有防止疾疟传播的作用，且剂量小，味不苦，毒付反应轻，服用方便，建议生产，逐步扩大使用。

大会筹备组

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net