DOI:10.16016/j.1000-5404.1979.03.026

原发性获得性冷性荨麻疹病例报告

第二附属医院　李为明整理　崔守信指导

原发性获得性冷性荨麻疹是儿童和成人的一种较少见疾病①，于1977年收治一例，现报告如下：

患儿，$9\frac{4}{12}$岁，女。入院前一年活动后双膝关节酸痛，但不红肿。入院前一周发热咽痛，院外诊断“急性扁桃体炎”，经治痊愈。一周内二次吃棒冰时发现嘴唇和接触棒冰之手指红肿。当接触冷水、或身体暴露部位受冷风刺激后均引起风疹块，无疼痛及紫癜，不经处理风疹块亦能随复温而自行消退。体检均无异常发现。

实验室检查：血，大小便常规和血小板计数均正常。血沉1小时末40毫米。抗链球菌溶血素O<500单位。胸部X线透视及二次心电图检查均正常。冷凝集素试验阴性。血清蛋白电泳：白蛋白60.1%、$\alpha_1$4.1%、α_2 8.2%、β9.8%、γ17.8%。免疫球蛋白IgG 1.120毫克%、IgA187毫克%、IgM125毫克%。粘蛋白90毫克%(按蛋白质计算)。血狼疮细胞阴性。冷球蛋白筛选试验阴性。冷试验阳性（验方略）。

住院经过：注射青霉素12天，入院一周开始服扑尔敏4毫克，日三次，共17天。服药三天后接触冷自来水无任何不适。服药17天再作冷试验（受冷10分钟）呈阴性反应。住院24天，无任何主诉不适，出院诊断原发性获得性冷性荨麻疹，嘱其注意保暖，禁止冷水浴，防止感染。



肝胆管结石症的外科治疗观点

第一附属医院肝胆外科　刘永雄　韩本立

黄志强审订

肝胆管结石是原发性胆管结石的重要组成部份但又有着特别重要的临床意义，它的含意是指左、右肝胆管开口以上的肝内胆管结石①②。近二十年来，我国外科工作者对它进行大量的研究，在诊断和治疗上均取得了显著成绩。

（一）

肝胆管结石症的临床意义：

肝胆管结石在我国有较高的发病率。黄志强报告肝内胆管结石，占28.3%③至47.6%④；刘永雄等⑤总结1952—1975年经手术治疗结石性胆道病，肝胆管结石277例，占26.11%。在国外②，马来西亚为10.2%，香港为23%，南朝鲜为20%；欧美等国的报告近年来亦有增加。应当指出，临床报告较病理解剖发现的比率要低，我校病理解剖教研研室在重庆地区所作之50例胆石症尸检中占38%①⑥。这是由于无论手术或X线造影检查，都受到一定的限制，不象尸检时那样详尽，往往难于发现肝内胆管尤其是第二级分枝以上的结石。

肝胆管结石症是胆道再次手术的最主要的原因。一组⑦分析71例主要为处理较复

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net